

# もも・ネクタリン特報 ①

令和8年3月2日  
JA中野市園芸課  
JA中野市りんご・もも部会

本年の生育は、平年に比べてやや早まる予想をしております。ただし今後の気象によっては前後する可能性もありますので、園地内をよく確認して薬剤散布の準備は早めに行ってください。

第1回目の防除に向けて、剪定作業・SS 走行路の確保・SS の試運転等を進めて下さい。

(参考：平岡地区 過去発芽日 R8 発芽予想)

あかつき	平年	R8	R7	R6	R5	R4
発芽日	3/29	3/27頃	3/27	4/2	3/22	4/3



## 【休眠期（発芽前）の散布】\*もも・ネクタリン共通

※昨年、カイガラムシ類の発生が多かった園地では、休眠期の防除を徹底しましょう。また、縮葉病は薬剤散布での死角となる部分（園地外周、樹の上部や先端）に多く発生が見られます。

薬剤散布時は風のない穏やかな日を選び、散布ムラのないよう樹全体に十分量を散布しましょう。

散布時期	発芽前（3月中下旬）	散布日	月	日
散布薬剤	水	98ℓ当たり		
	アプロードフロアブル	100ml		
	キンセット水和剤80	100g		
	スプレーオイル	2ℓ		
対象病害虫	縮葉病・せん孔細菌病・カイガラムシ類・ハダニ類			
散布量	10a 当たり：300ℓ			
注意事項	① アプロードフロアブル：もも（14日前、3回） ネク（7日前、2回） ② キンセット水和剤80：もも（開花直前（但し収穫60日前）、5回） ネク（開花直前、5回） ③ 【代替】キンセット水和剤80、アプロードフロアブルに代えて、石灰硫黄合剤の10倍でもよい。ただし、隣接するハウスビニールにはかからないように注意する。			

次面には病害虫対策、凍害対策、摘蕾など記載

次回特報配布日  
3月17日（予定）

## 【せん孔細菌病・縮葉病・カイガラムシ類・コスカシバ防除対策】

- ① 【せん孔細菌病対策】：枯れている枝は、見つけ次第切除する。
- ② 【縮葉病対策】：昨年発生が多かった園地では、発芽前散布を徹底する。  
(散布ムラの無いよう十分な量を散布する)
- ③ 【カイガラムシ類対策】：発生園は被害部を金ブラシ等で削り落す作業を実施する。
- ④ 【コスカシバ対策】：発生園は被害部の樹脂を取り除き、フェニックスフロアブルの 500 倍  
(開花期まで、1 回) を樹幹部に散布する。

## 【凍害対策について】

樹体衰弱・枯死の原因は多数考えられています。一つとして冬季の気温上昇と3～4月の寒のもどりによって樹体凍害が発生し、樹勢衰弱・枯死に至っています。園内環境（排水性・風当たり等）によっても凍害の発生に差が見られるため、凍害の多発園地では、以下の事項にご注意ください。

- ① 稲わら等の資材を樹幹に巻きつけている場合は、除去を遅らせる。(4月下旬頃に除去する)  
薬剤散布が樹幹にかかりづらい状況になるが、凍害発生が心配されるため、稲わら等の除去を遅らせる。
- ② 排水性の悪い園地では、暗きよや明きよ等によって排水対策に努める。また、新たに苗木を定植する場合は、浅植えとする。
- ③ 風当たりの強い園地では、防風ネット、防風林等の導入を検討する。

## 【摘蕾】：凍霜害の被害が心配される園地でも、高品質生産に向けて摘蕾を実施する。

時期：3月下旬～4月上中旬（蕾の先端がピンク色になるまでふくらんだ頃が効率良い）  
遅れた場合は落花期までに花摘みを行なう。

### ◎摘蕾の方法

- ① 主枝・亜主枝・側枝など伸ばす枝の延長枝はすべて摘蕾し、垂れないよう強く保つ。
- ② 真上、真下の蕾を除く。斜め、横向きは残す。  
(凍霜害が心配される場合は、真上の蕾を除く)

- ③ 結果枝の長さによる、摘蕾方法は右図を参照。




図1-10 摘蕾の方法