

もも・ネクタリン特報

⑪

令和7年8月15日
JA中野市園芸課
JA中野市りんご・もも部会

- ・8月中旬の散布薬剤については、8/4 配布の特報No.⑩をご確認ください。
- ・除袋遅れには十分注意して下さい。(除袋目安：収穫 10～14 日前に実施)
- ・北信地域に「シンクイムシ多発注意報」が発出されています。発生・被害状況の確認と、被害果実は直ちに除去し、園外で処分(埋没、水没など)して下さい。
- ・裏面には、もも第12回以降【極晩生種】特別散布を記載しています。

【もも】 第12回 薬剤散布

散布時期	8月下旬 目安：8/25～8/30頃	散布日	月	日
散布薬剤	水	100ℓ 当たり	散布量	ℓ
	展着剤(ハイテンパワー)	10ml		
	ベルコートフロアブル	50ml (前日、3回)		
	アーデントフロアブル	50ml (前日、3回)		
対象病害虫	黒星病、灰星病、ホモブシス腐敗病 シンクイムシ類、カメムシ類、アザミウマ類			
散布量	10a 当たり：500ℓ			
注意事項	①有袋品種は、除袋後に散布する。			

【ネクタリン】 第12回 薬剤散布

散布時期	8月下旬 目安：8/25～8/30頃	散布日	月	日
散布薬剤	水	100ℓ 当たり	散布量	ℓ
	展着剤(ハイテンパワー)	10ml		
	ベルコートフロアブル	50ml (前日、2回)		
対象病害虫	黒星病、灰星病、ホモブシス腐敗病			
散布量	10a 当たり：500ℓ			
注意事項	【もも混植園】シンクイムシ類対策 ・アーデントフロアブルの2,000倍(前日、3回)を加用する。			

次回特報配布日
9月2日(予定)



【もも極晩生種】

特別散布薬剤

散布時期	9月中旬 目安：9/10～9/15頃	散布日	月	日
散布薬剤	水	100ℓ	あたり	
	展着剤（ハイテンパワー）	10ml		
	【殺菌剤】			
	オンリーワンフロアブル	50ml	（前日、3回）	
対象病害虫	【殺虫剤】（どちらかを選択）			
	①モスピラン顆粒水溶剤	50g	（前日、3回）	
	②イカズチWDG	66g	（前日、5回）	
対象病害虫	黒星病、灰星病、ホモブシス腐敗病 シンクイムシ類、カメムシ類、アザミウマ類、モモハモグリガ等			
散布量	10aあたり：500ℓ			
注意事項	①有袋品種は、除袋後に散布する。			

【晩生種～極晩生種】収穫開始予想

直前の気象条件によって前後しますが、下表を参考に園地内の果実状況を見て収穫を判断して下さい。

早生種（あかつき）、中生種（なつっこ）等の経過を見ると、成熟・着色が遅れており果肉軟化が早く日持ち性が悪い状況です。そのため、晩生種以降の品種も肥大・着色を待ちすぎず熟度を優先し、地色がやや残る状態での収穫をお願いします。

※収穫前に必ず食味・糖度チェックをし収穫を進めて下さい。

品種名	南部地区	平岡地区
幸茜	9/5頃	9/7頃
さくら白桃	9/8頃	9/11頃
黄貴妃（無着色）	9/5頃	9/7頃
選抜白根白桃（岩戸系）	9/8頃	9/10頃
在来系白根白桃	9/10頃	9/12頃
ゴールデンピーチ	9/15頃	9/18頃
秀峰（ネクタリン）	9/5頃	9/7頃