

もも・ネクタリン特報 ③

令和8年3月30日
JA中野市園芸課
JA中野市りんご・もも部会

開花期（1～2輪咲き）の散布薬剤については、特報No.②をご確認ください。

（参考：平岡地点 過去開花日 R8 開花予想）

あかつき	平年	R8	R7	R6	R5	R4
開花日	4/14	4/7頃?	4/18	4/13	4/6	4/18



第3回薬剤散布 【もも・ネクタリン共通】

散布時期	落花直後（4月中下旬：樹全体の花が80～90%散った頃）	散布日	月	日
散布薬剤	水	100ℓ	あたり	
	展着剤（アピオンE）	50ml		
	サムコルフロアブル10	20ml	もも（前日、2回）	ネク（3日前、2回）
	パレード15フロアブル	50ml	（前日、2回）	
	アグレプト水和剤	100g	（60日前、2回）	
対象病害虫	せん孔細菌病、黒星病、灰星病、うどんこ病、モモハモグリガ、ハマキムシ類			
散布量	10a 当たり：350ℓ			
注意事項	① <u>アブラムシ類対策</u> ： もも：ウララDFの2,000倍（14日前、2回）を加用する。 ネク：ウララDFの2,000倍（7日前、2回）を加用する。 ②アグレプト水和剤、アグリマイシン-100等の使用回数は、合計2回までとする。尚、ぶどうにかかると種無し化が生じるため、飛散には注意する。			

※せん孔細菌病重要防除期間（撲滅に向けて）

発生のある園地では引き続き枝病斑の切除、防除の徹底をお願い致します。

結実が心配される品種（川中島白桃など）は、必ず人工授粉を実施する

花粉が少ない品種や全く無い品種は、必ず人工授粉を行なってください。あらかじめ開薬し採取した花粉で受粉することが最良ですが、授粉樹（花粉の多い品種）で開花している花の花粉を毛バタキ・綿棒に付けて受粉（相互交配）する方法もあります。

共同開薬所利用料に対する助成（20%以内）も実施致しますのでご活用下さい。

※授粉適期：1回目：5～6分咲き頃 2回目：満開～満開後

次回特報配布日
4月17日（予定）