

# もも・ネクタリン特報 ③

令和6年5月2日  
JA中野市営農センター  
JA中野市りんご・もも部会

落花後の防除（目安：4月下旬）については、特報No.②をご確認ください。

【生育状況】（参考：平岡地点）

あかつき	平年	R6	R5	R4	R3	R2
開花	4/16	4/13	4/6	4/18	4/8	4/17
満開	4/21	4/16	4/11	4/23	4/13	4/22
落花	4/29	4/26頃	4/19	4/30	4/24	5/1



## 第4回 薬剤散布 【もも】 ※せん孔細菌病重要防除期間

散布時期	落花 10 日後 目安：5/5 ~ 5/10 頃	散布日	月	日
散布薬剤	水	100ℓ 当たり	散布量	ℓ
	展着剤（アピオンE）	50ml		
	劇モスピラン顆粒水溶剤	25g	（前日、3回）	
	ストロビードライフフロアブル	50g	（前日、3回）	
	アグレプト水和剤	100g	（60日前、2回）	
対象病害虫	せん孔細菌病、黒星病、灰星病、うどんこ病 アブラムシ類、モモハモグリガ、シンクイムシ類、カメムシ類			
散布量	10a 当たり：400ℓ			
注意事項	① モスピラン顆粒水溶剤は「劇物」です。購入の際は「印鑑」をご持参下さい。 ② アグレプト水和剤、アグリマイシン-100 等の使用回数は、合計 2 回までとする。尚、ぶどうにかかると種無し化が生じるため、飛散には注意する。			

## 第5回 薬剤散布 【もも】 ※せん孔細菌病重要防除期間

散布時期	5 月中下旬 目安：5/15 ~ 5/20 頃	散布日	月	日
散布薬剤	水	100ℓ 当たり	散布量	ℓ
	展着剤（アピオンE）	50ml		
	トレノックスフロアブル	200ml	（7日前、5回）	
	劇ハチハチフロアブル	50ml	（前日、2回）	
	マイコシールド	66g	（21日前、5回）	
対象病害虫	せん孔細菌病、黒星病、灰星病、うどんこ病、モモハモグリガ、アブラムシ類			
散布量	10a 当たり：500ℓ			
注意事項	① 【代替】マイコシールドに代えて、クプロシールドの1,000倍（-、-）でもよい。ただし、葉に薬害を生じる恐れがあるため、クレフノン 100 倍を加用し、展着剤はハイテンパワーの 10,000 倍を使用する。 ② シンクイムシ類・カメムシ類対策 ハチハチフロアブルに代えて、劇イカズチWDGの1,500倍（前日、5回）でもよい。			

**第4回 薬剤散布 【ネクタリン】 ※せん孔細菌病重要防除期間**

散布時期	落花 10 日後 目安：5/5 ～ 5/10 頃	散布日	月	日
散布薬剤	水	100ℓ 当たり		
	展着剤（アピオンE）	50ml		
	劇モスピラン顆粒水溶剤	25g	（3日前、3回）	
	トレノックスフロアブル	200ml	（30日前、5回）	
	マイコシールド	66g	（28日前、5回）	
散布量	10a 当たり：400ℓ			
対象病害虫	せん孔細菌病、黒星病、灰星病 モモハモグリガ、アブラムシ類、シンクイムシ類、カメムシ類			
注意事項	① モスピラン顆粒水溶剤は「劇物」です。購入の際は「印鑑」をご持参下さい。 ② 【代替】トレノックスフロアブルに代えて、ストロビードライフフロアブルの2,000倍（前日、3回）でもよい。			

**第5回 薬剤散布 【ネクタリン】 ※せん孔細菌病重要防除期間**

散布時期	5 月中下旬 目安：5/15 ～ 5/20	散布日	月	日
散布薬剤	水	100ℓ 当たり		
	展着剤（アピオンE）	50ml		
	トレノックスフロアブル	200ml	（30日前、5回）	
	劇ハチハチフロアブル	50ml	（前日、2回）	
	マイコシールド	66g	（28日前、5回）	
散布量	10a 当たり：500ℓ			
対象病害虫	せん孔細菌病、黒星病、灰星病、モモハモグリガ、カメムシ類、シンクイムシ類			
注意事項	① 【代替】マイコシールドに代えて、クプロシールドの1,000倍（-、-）でもよい。ただし、葉に薬害を生じる恐れがあるため、クレフノン100倍を加用し、展着剤はハイテンパワーの10,000倍を使用する。 ② 【代替】ハチハチフロアブルに代えて、劇イカズチWDGの1,500倍（前日、2回）でもよい。			

次回特報配布日  
5月17日（予定）