

もも・ネクタリン特報 ④

令和7年5月2日
JA中野市園芸課
JA中野市りんご・もも部会

落花 10 日後の防除（目安：5 月上中旬）については、特報No.③をご確認ください。

【生育状況】（参考：平岡地点）

あかつき	平年	R7	R6	R5	R4	R3
開 花	4/14	4/18	4/13	4/6	4/18	4/8
満 開	4/19	4/22	4/16	4/11	4/23	4/13
落 花	4/28	5/1 頃	4/26	4/19	4/30	4/24



第5回 薬剤散布【もも・ネクタリン共通】 ※せん孔細菌病重要防除期間

散布時期	5 月中下旬 目安：5/18～ 5/23 頃	散布日 月 日
散布薬剤	水 100ℓ 当たり 展着剤（アピオンE） 50ml トレノックスフロアブル 200ml もも（7 日前、5 回） ネク（30 日前、5 回） 劇ハチハチフロアブル 50ml もも・ネク（前日、2 回） マイコシールド 66g もも（21 日前、5 回） ネク（28 日前、5 回）	散布量 ℓ
対象病害虫	せん孔細菌病、黒星病、灰星病、モモハモグリガ、アブラムシ類、シンクイムシ類	
散布量	10a 当たり：500ℓ	
注意事項	① 【代替】マイコシールドに代えて、クプロシールドの 1,000 倍（-、-）でもよい。 ただし、葉に薬害を生じる恐れがあるため、クレフノン 100 倍を加用し、展着剤はハイテンパワーの 10,000 倍を使用する。 ② シンクイムシ類・カメムシ類対策 ハチハチフロアブルに代えて、劇イカズチ WDG の 1,500 倍（前日、5 回）、ネクタリン：（前日、2 回）でもよい。	



【ナシヒメシンクイ芯折れ症状について】

左写真は、前年の新梢先端部への食害になります。
近年、中野市管内のもも園地にて散見されています。
園地内で症状が見られる場合は、せん孔細菌病春型枝病斑と併せて切除を行って下さい。

- ・発生時期：5 月上中旬頃～
（第 1、第 2 世代が新梢を加害する）
- ・防除対策：上記の第 5 回散布のハチハチフロアブルに代えて、劇イカズチ WDG が有効的。
- ・ご不明な点は担当技術員までお問い合わせ下さい。

次回特報配布日
5 月 16 日（予定）