



もも・ネクタリン特報 ⑤

令和8年5月1日
JA中野市園芸課
JA中野市りんご・もも部会

落花 10 日後の防除（目安：5 月上旬）については、特報No.④をご確認ください。

【生育状況】（参考：平岡地点）

あかつき	平年	R8	R7	R6	R5	R4
開花	4/14	4/9	4/18	4/13	4/6	4/18
満開	4/18	4/14	4/22	4/16	4/11	4/23
落花	4/27	4/22	4/30	4/26	4/19	4/30



第5回 薬剤散布【もも・ネクタリン共通】 ※せん孔細菌病重要防除期間

散布時期	5 月中下旬 目安：5/10～ 5/15 頃		散布日	月	日
散布薬剤	水	100ℓ 当たり	散布量	ℓ	
	展着剤（アビオンE）	50ml			
	トレノックスフロアブル	200ml	もも（7 日前、5 回） ネク（30 日前、5 回）		
	劇ダイアジノン水和剤 34	100g	もも（前日、4 回） ネク（21 日前、3 回）		
	IC ジンク水和剤	100g	もも・ネク （発病前～発病初期、8 回）		
対象病害虫	せん孔細菌病、黒星病、灰星病、モモハモグリガ、アブラムシ類、シンクイムシ類				
散布量	10a 当たり：500ℓ				
注意事項	① 【代替】劇ダイアジノン水和剤に代えて、劇ハチハチフロアブルの 2,000 倍（前日、2 回）でもよい。 ② 【代替】ICジンク水和剤に代えて、マイコシールドの 1,500 倍もも（21 日前、5 回）ネク（28 日前、5 回）でもよい。				



【ナシヒメシンクイ芯折れ症状について】

左写真は、前年の新梢先端部への食害になります。近年、中野市管内のもも園地にて散見されています。園地内で症状が見られる場合は、せん孔細菌病春型枝病斑と併せて切除を行って下さい。

- ・発生時期：5 月上中旬頃～
（第 1、第 2 世代が新梢を加害する）
- ・ご不明な点は担当技術員までお問い合わせ下さい。

次回特報配布日
5 月 14 日（予定）

【もも・ネクタリン共通】

第6回 薬剤散布 ※せん孔細菌病重要防除期間

散布時期	5月下旬 目安：5/20 ~ /25頃	散布日	月	日
散布薬剤	水	100ℓ当たり	散布量	ℓ
	展着剤（アピオンE）	50ml		
	アルバリン顆粒水溶剤	50g	共通：（前日、3回）	
	トレノックスフロアブル	200ml	もも：（7日前、5回）	
	マイコシールド	66g	ネク：（30日前、5回）	
			もも：（21日前、5回）	
			ネク：（28日前、5回）	
対象病害虫	せん孔細菌病、黒星病、灰星病 アブラムシ類、モモハモグリガ、シンクイムシ類、カメムシ類			
散布量	10a 当たり：500ℓ			
注意事項	カイガラムシ類対策：コルト顆粒水和剤の2,000倍（前日、3回）を加用する。			

【もも特別散布】 ※せん孔細菌病重要防除期間

散布時期	5月下旬～6月初旬 目安：5/27 ~ 6/2頃	散布日	月	日
散布薬剤	水	100ℓ当たり	散布量	ℓ
	展着剤（アピオンE）	50ml		
	マイコシールド	66g	（21日前、5回）	
対象病害虫	せん孔細菌病			
散布量	10a 当たり：500ℓ			
注意事項	せん孔細菌病多発園地は、前回散布から7～10日後に散布する。			