


もも・ネクタリン特報 ⑨

令和8年7月1日
JA中野市園芸課
JA中野市りんご・もも部会



7月上旬の散布薬剤については、6/16配布の特報No.⑧をご確認ください。
除袋遅れには十分注意して下さい。(除袋目安：収穫10～14前に実施)

【もも】 第10回 薬剤散布

散布時期	7月下旬 目安：7/20～7/25頃	散布日	月	日
散布薬剤	水	100ℓ当たり	散布量	ℓ
	展着剤（ハイテンパワー）	10ml		
	ベルコートフロアブル	50ml（前日、3回）		
	劇テルスターフロアブル	33ml（前日、2回）		
対象病害虫	黒星病、灰星病、ホモブシス腐敗病 シンクイムシ類、カメムシ類、（アザミウマ類）			
散布量	10a当たり：500ℓ			
注意事項	①有袋品種は、除袋後に散布する。 ②ハダニ類対策：ダニオーテフロアブルの2,000倍（前日、1回）を加用する。 ③カイガラムシ類対策：除袋後の散布にコルト顆粒水和剤の2,000倍（前日、3回）を加用する。			

【ネクタリン】 第10回 薬剤散布

散布時期	7月下旬 目安：7/20～7/25頃	散布日	月	日
散布薬剤	水	100ℓ当たり	散布量	ℓ
	展着剤（ハイテンパワー）	10ml		
	ベルコートフロアブル	50ml（前日、2回）		
	劇テルスターフロアブル	33ml（前日、2回）		
対象病害虫	黒星病、灰星病、ホモブシス腐敗病 シンクイムシ類、カメムシ類、アザミウマ類			
散布量	10a当たり：500ℓ			

*降雨が続くと園地がぬかるみ、薬剤散布中や作業中等の事故が起きやすくなります。作業の際は安全に十分留意しましょう。また、熱中症対策としてこまめな水分補給・休憩をとりましょう。
*農薬散布の際は近隣園へのドリフトを注意すると共に、通勤通学時間の散布は十分注意下さい。

次回特報配布日
7月16日（予定）