りんご特報 No.10

令和７年９月２日
ＪＡ中野市園芸課
ＪＡ中野市りんご･もも部会

・北信地域に「シンクイムシ多発注意報」が発出されています。発生・被害状況の確認と、被害果実は直ちに除去し、園外で処分（埋没、水没など）して下さい。
・高温少雨傾向が続いてます。樹勢が弱っている場合は見直し摘果により着果量を調整し、樹の負担軽減に努めて下さい。

【第１３回　定期散布】＊散布時期は目安です。

【定期散布】散布日
　　月　　日（　　）
散布量
　　ℓ

散布時期	９/９～9/１５　　＊前回から 14 日以内
散布薬剤	水　１００ℓ当たり 展着剤（ハイテンパワー）　１０㎖ ダントツ水溶剤　５０ｇ　（前日、３回） アリエッティＣ水和剤　１２５ｇ　（前日、３回）
対象病害虫	輪紋病、炭疽病、斑点落葉病、黒星病、褐斑病、すす斑病、すす点病 シンクイムシ類、カメムシ類、ケムシ類、ギンモンハモグリガ コガネムシ類、コナカイガラムシ類
散布量	500ℓ／10a
注意事項	①【汚れ軽減】 展着剤ハイテンパワーに代えて、スカッシュの 2,000 倍またはササラの 2,000 倍を使用する。

隣接園に薬剤が飛散しないよう十分注意して下さい

＊９月も残暑が続く場合は、シンクイムシ対策として、次回定期散布に殺虫剤を加用する可能性があります。詳細は次回特報でお知らせします。

裏面もご覧ください。（落果防止剤　　着色向上対策・葉面散布資材　他）

【落果防止剤】の散布について】単用散布

散布時期	秋映、紅玉　：　9/5～15 頃　＊収穫開始予定 25～15 日前に 1 回散布 シナノゴールド：　9/15～25 頃　＊注意事項④参照
散布薬剤	水　１００ℓ当たり ストッポール液剤　１００㎖　（収穫予定の 25～7 日前、2 回以内）
散布量	500～600ℓ／10a
注意事項	①展着剤は加用しない。単用散布を厳守する。（他の薬剤、葉面散布剤等と混用しない。） ②乾燥条件下では効果が低減するので、定期的なかん水を行い、園地内の湿度を上げる等の対策を図る。 ③落果防止剤を散布すると熟度が早まり、果肉軟化を助長しやすいので、過熟果発生に注意して収穫を進める。 ④昨年、シナノゴールドの収穫前落果が発生した園地は、落果防止剤を散布する。

●りんご着色向上対策・葉面散布資材（対象：シナノスイート、ふじ等）

高温により着色遅れが心配されます。下表を参考に定期散布に加用してください。

下記資材は定期散布に混用可能です。選択により使用してください。

商品名	使用時期	倍率	使用時期	単価/規格
彩色甘味 （おすすめ！）	着色促進 糖度向上	1,000	９月上旬～10 月初旬 ＊収穫予定日 40 日前と 20 日前	3,350 円/500g
メリット赤	着色促進 樹勢調整	300	９月上旬～10 月初旬 ＊収穫２か月前から３回散布	9,160 円/6 ㎏ 1,800 円/1kg
モーニングエース	着色促進 品質向上	500	９月上旬～10 月初旬 ＊収穫 20～25 日前	6,480 円/500g

●秋映の葉摘みについて

・９月１０日頃～（ある程度着色が進んできた頃）

・残暑が続き日焼けの発生が心配される場合は、葉摘みを軽く行なう（密着葉を摘む）程度とし、日焼け軽減に努めて下さい。

問合せ先：園芸課 23-3933

次回発行予定 9/17