



# りんご特報 No.11

令和7年9月17日

J A中野市園芸課

J A中野市りんご・もも部会

- ・北信地域に「シンクイムシ多発注意報」が発出されています。発生・被害状況の確認と、被害果実は直ちに除去し、園外で処分（埋没、水没など）して下さい。
- ・高温が続きシンクイムシ類の発生が心配される場合は、殺虫剤「劇イカズチWDG」または「エクシレルSE」を加用して下さい。（注意事項①参照）

## 【第14回 定期散布】 \*散布時期は目安です。

散布時期	9/23~9/29 *前回から14日以内	【定期散布】散布日 __月 日( ) 散布量 _____ℓ
散布薬剤	水 100ℓ 当たり 展着剤（ハイテンパワー） 10ml ストライド顆粒水和剤 66g (前日、3回)	
対象病害虫	炭疽病、斑点落葉病、褐斑病、すす斑病、すす点病、黒星病	
散布量	500ℓ / 10a	
注意事項	①【シンクイムシ対策】 <u>劇イカズチWDGの1,500倍（前日、2回）、またはエクシレルSEの5,000倍（前日、3回）を加用する。</u> ②【薬害注意】ストライド顆粒水和剤は、高温時に散布すると薬害が生じる恐れがあるため、涼しい時間帯に散布する。 ③【かぶれ注意】ストライド顆粒水和剤による肌のかぶれが心配される場合は、ストライドに代えてクプロシールドの1,000倍（収穫前使用規制、使用回数制限なし）を使用してもよい。	

隣接園に薬剤が飛散しないよう十分注意して下さい

次面もご覧ください。（10月上旬特別散布）

## 特別散布 \*晩生種（ふじ等）すす点・すす斑病対策

特に第 14 回定期防除日が予定よりも1週間以上前倒しになっている場合は、この特別散布を実施下さい。

【定期散布】散布日
____月 ____日(____)
散布量
_____ℓ

散布時期	10月上旬 *前回から10日後
散布薬剤	水 100ℓ 当たり 展着剤（ハイテンパワー） 10ml ベルコートフロアブル 66ml (前日、3回)
対象病害虫	すす斑病、すす点病、斑点落葉病、褐斑病、黒星病、黒点病、輪紋病
散布量	500ℓ / 10a
注意事項	①【汚れ軽減】 展着剤ハイテンパワーに代えて、スカッシュの2,000倍またはササラの2,000倍を使用する。

## ●りんご着色向上対策・葉面散布資材 (対象：シナノスイート、ふじ等)

高温により着色遅れが心配されます。下表を参考に定期散布に加用してください。

下記資材は定期散布に混用可能です。選択により使用してください。

商品名	使用時期	倍率	使用時期	単価/規格
彩色甘味 (おすすめ!)	着色促進 糖度向上	1,000	9月上旬～10月初旬 *収穫予定日40日前と20日前	3,350円/500g
メリット赤	着色促進 樹勢調整	300	9月上旬～10月初旬 *収穫2か月前から3回散布	9,160円/6kg 1,800円/1kg
モーニングエース	着色促進 品質向上	500	9月上旬～10月初旬 *収穫20～25日前	6,480円/500g

## ●シナノスイート「芯カビ果」の除去について

- ・異常に「着色の進んだ」果実、「地色が抜けている」果実は、「芯カビ」が発生している可能性があります。芯カビが疑われる果実を何個か割って中身を確認しながら、除去を進めて下さい。

問合せ先：園芸課 23-3933