



# りんご特報 No.6

令和8年6月1日

J A中野市園芸課

J A中野市りんご・もも部会

**輪紋病・炭疽病・褐斑病対策 重点防除期間(6月~7月)**  
**散布ムラが無いように、樹全体に万遍なく散布しましょう**

**【第7回 定期散布】** \*散布時期は目安です。

【定期散布】 散布日

6月 日

散布量

ℓ

散布時期	6/14~20 *第4回定期散布から14日後		
散布薬剤	水	100ℓ 当たり	
	展着剤 (ハイテンパワー)	10ml	
	Ⓜ モスピラン顆粒水溶剤	25g	(前日、3回)
	ベランティーフロアブル	12ml	(14日前、3回)
	オキシラン水和剤	<u>140g (下欄参照)</u>	(14日前、4回)
	(カルタス (カルシウム葉面散布剤))	100ml	
対象病害虫	輪紋病、斑点落葉病、黒星病、黒点病、シンクイムシ類、カメムシ類、キンモンホソガ、ケムシ類、リンゴワタムシ、カイガラムシ類、アブラムシ類		
散布量	10a 当たり : 600ℓ		
注意事項	①【炭疽病対策】オキシラン水和剤に代えて、キノドーフロアブルの1,000倍(14日前、4回)とオーソサイド水和剤80の800倍を使用する。 ②【幼果カルシウム補給】カルタス1,000倍を加用する。 ③【カメムシ対策】モスピラン顆粒水溶剤の倍率を2,000倍にする。 ④【代替】ベランティーフロアブルに代えて、オンリーワンフロアブルの2,000倍(7日前、3回)でもよい。		

**重要** 【オキシラン水和剤の登録変更について】

R8年春、「オキシラン水和剤」のリンゴ登録内容が変更となりました。

希釈倍率 : 700~800倍 (変更前: 500倍)

適用病害虫 : 輪紋病、黒星病、斑点落葉病、黒点病 (炭疽病を削除)

\*炭疽病対策 (つがる、シナノゴールド、ムーンルーシュ、王林等) は、【注意事項①】の通り  
対応をお願い致します。 不明な点は、園芸課・担当技術員へお問合せ下さい。

次面もご覧ください。(特別散布、仕上げ摘果について)

## 特別散布（輪紋病 対策）

【特別散布】散布日

\_\_\_\_月 \_\_\_\_日

散布量

\_\_\_\_ℓ

散布時期	6月下旬（6/23～29）	
散布薬剤	水 IC ボルドー412	100ℓ 当たり 3.3kg
対象病害虫	輪紋病	
散布量	10a 当たり：600ℓ	
注意事項	シナノリップ、夏あかり、つがる等の早生種には散布しない。（果面の汚れ）	

### ●着果管理『ふじの仕上げ摘果』について（摘果作業終了目標：6月末までに）

#### ①目的 果実品質向上（肥大、糖度等）


- ・果実品質の選別
- ・着果量の調整（仕上げ摘果後も「見直し摘果」を行ないます。）
- ・光玉（青玉果）の除去

#### ②摘果する果実

- ・傷、サビ、障害果、変形果、極端に小さい果実
- ・常に日光を受ける果実（日焼けになりやすい）

#### ③着果基準

- ・結果枝「30cmに1果」



「農作業事故に注意しましょう」  
「水分をとり、熱中症に注意しましょう」

次回発行予定 6/17  
問合先：園芸課 23-3933