



りんご特報 No.7

令和8年6月16日

J A中野市園芸課

J A中野市りんご・もも部会

輪紋病・炭疽病・褐斑病対策 重点防除期間中(6月~7月)
定期散布の間隔は14日以内を徹底し、予防を意識した降雨前の
散布に努めましょう。

輪紋病・炭疽病・褐斑病の重点防除期間です。また、今回からハダニ対策の殺虫剤の散布が始まります。散布量を多めに設定し、樹全体に万遍なく散布してください。

【第8回 定期散布】 *散布時期は目安です。

【定期散布】 散布日

___月 ___日()

散布量

___ℓ

散布時期	6/28~7/4 *前回から14日以内		
散布薬剤	水	100ℓ 当たり	
	展着剤 (スカッシュ)	100ml	
	㊦ バイスロイド EW	50ml	(7日前、4回)
	フリントフロアブル 25	50ml	(前日、4回)
	エコマイト顆粒水和剤	50g	(前日、1回)
	ユニックス顆粒水和剤 47 (カルタス (カルシウム葉面散布剤) 100ml)	50g	(14日前、4回)
対象病害虫	炭疽病、輪紋病、褐斑病、斑点落葉病、黒星病、シンクイムシ類、キンモンホソガ、カメムシ類、ハマキムシ類、ギンモンハモグリガ、ハダニ類		
散布量	600ℓ / 10a		

「炭疽病」防除ポイント

- ・ **伝染源** ニセアカシア、クルミ等が近くにある園地では恒常的に発生しやすい。

一次感染期 (6/上~7/末 梅雨期)

- ・ 定期防除の散布量は十分に
- ・ むらなく防除する (死角がないか)
- ・ 雨が多いときは特別散布が必要

二次感染期 (8/中~9/下)

- ・ 発病果の除去と園外への持ち出し
- ・ むらなく防除する (死角がないか)

次面もご覧ください。

【炭疽病対策 特別散布】

降水量が多く炭疽病等の感染が心配される場合は、特別散布を実施下さい。

散布時期	7/5~12頃 *第8回定期散布から7日後	【特別散布】散布日 7月 日()
散布薬剤	水 100ℓ当たり 展着剤(ハイテンパワー) 10ml オーソサイド水和剤80 125g (前日、6回)	散布量 ℓ
対象病害虫	炭疽病、輪紋病、斑点落葉病、褐斑病、すす点病、すす斑病	
散布量	600ℓ/10a	

葉面散布資材の紹介(葉の光合成促進など)

7月から花芽分化期を迎えます。光合成・花芽形成促進を目的に、葉面散布を実施下さい。
(定期散布混用可)

商品名	保証成分量	使用目的	倍率	使用時期と効能	規格 単価
オルガミン	窒素 0.11% 苦土 4% ほう素 0.7% 加里 0.11% マンガン0.25%	光合成促進 品質向上等	1,000 ~ 2,000	収穫期まで(定期散布混用)	1ℓ 4,100円
				葉色向上・落果軽減・品質向上	5ℓ 17,600円
					10ℓ 32,800円
葉友	窒素 5% リン酸 0.1% 加里 0.5% 高濃度総合アミノ酸	光合成促進 花芽充実	2,000	落花後から収穫期まで (定期散布混用)	1ℓ 4,450円
				葉色の維持・光合成の促進に効果的	4ℓ 16,870円
					20ℓ 78,690円

「農作業事故に注意しましょう」
「こまめに水分をとり、熱中症に注意しましょう」

次回特報発行予定 7/1
問合せ先：園芸課 23-3933