



りんご特報 No.9

令和 7 年 8 月 15 日
J A 中野市園芸課
J A 中野市りんご・もも部会

- ・高温が続き、「ハダニ類」の発生が心配される場合は、第 12 回定期散布に「ダニオーテフロアブルの 2,000 倍」を加用して下さい。（注意事項①参照）
- ・北信地域に「シンクイムシ多発注意報」が発出されています。発生・被害状況の確認と、被害果実は直ちに除去し、園外で処分（埋没、水没など）して下さい。

【第 12 回 定期散布】＊散布時期は目安です。

【第 12 回 定期散布】＊散布時期は目安で9。			【定期散布】散布日 ____月 ____日（ ____ ） 散布量 _____ℓ	
散布時期	8/26～9/1 ＊前回から 14 日以内			
散布薬剤	水	1 0 0 ℓ 当たり		
	展着剤（ハイテンパワー）	1 0 ml		
	劇イカズチWDG	6 6 g		（前日、2回）
	オーソサイド水和剤 80	1 2 5 g		（前日、6回）
対象病害虫	輪紋病、炭疽病、斑点落葉病、黒星病、褐斑病、すす斑病、すす点病 シンクイムシ類、カメムシ類、ハマキムシ類、キンモンホソガ、ギンモンハモグリガ			
散布量	500 ℓ / 10a			
注意事項	①【ハダニ対策】 ダニオーテフロアブルの 2,000 倍（前日、1 回）を加用散布または、特別散布する。＊尚、ダニオーテを散布する際は、銅剤（キノンドー等）散布から概ね 45 日後以降とする。			
	②【汚れ軽減】 展着剤ハイテンパワーに代えて、スカッシュの 2,000 倍またはササラの 2,000 倍を使用する。			

隣接園に薬剤が飛散しないよう十分注意して下さい

裏面もご覧ください。（秋映の落果防止剤 着色向上対策・葉面散布資材 他）

秋映 【落果防止剤】の散布について】単用散布

【散布日】

月 日 ()

散布量

ℓ

散布時期	9/5～15 頃 *収穫開始予定の 15 日前に 1 回散布
散布薬剤	水 100ℓ 当たり ストッポール液剤 100ml (収穫予定の 25～7 日前、2 回以内)
散布量	500～600ℓ / 10a
注意事項	①展着剤は加用しない。単用散布を厳守する。⇒ 他剤と混用しない。 ②乾燥条件下では効果が低減するので、定期的なかん水を行い、園地内の湿度を上げる等の対策を図る。 ③落果防止剤を散布すると熟度が早まり、果肉軟化を助長しやすいので、過熟果発生に注意して収穫を進める。

●りんご着色向上対策・葉面散布資材 (対象：シナノスイート、ふじ等)

高温により着色遅れが心配されます。下記資材を参考に定期散布に加用してください。

- ・下記資材はすべて定期散布に混用可能です。選択により使用してください。

商品名	使用時期	倍率	使用時期	単価/規格
彩色甘味 (おすすめ!)	着色促進 糖度向上	1,000	9月上旬～10月初旬 *収穫予定日 40 日前と 20 日前	3,350 円/500g
メリット赤	着色促進 樹勢調整	300	9月上旬～10月初旬 *収穫 2 か月前から 3 回散布	9,160 円/6 kg 1,800 円/1kg
モーニングエース	着色促進 品質向上	500	9月上旬～10月初旬 *収穫 20～25 日前	6,480 円/500g

●中生種の収穫について

着色のみならず、鮮度・食味・日持ち性を考慮し、収穫を開始してください。

品種	収穫開始見込み	注意事項
シナノドルチェ	9/1 頃	果肉軟化が早い特性がありますので収穫遅れに注意して下さい。
すわっこ	9/1～10 頃	蜜入りすると、早期に果肉褐変する傾向があります。 収穫遅れのないようご注意ください。
千秋	9/15 頃	一定の着色が乗った果実から順次収穫を開始してください。
シナノピッコロ	9/5～15 頃	一定の着色が乗った果実から順次収穫を開始してください。

問合せ先：園芸課 23-3933

次回発行予定 9/2