



JA中野市りんご・もも部会

【第10回 定期散布】＊散布時期は目安です。

月 日 ()

 q

＊熱中症対策（こまめな休憩、水分補給）に留意しましょう。

次面もご覧ください。(シナノリップ着色管理 他)

【高温対策について】

1. 土壌の乾燥防止

- ①かん水 ：定期的なかん水を行なう。（晴天が概ね 5～6 日続いたら実施）
 - ・かん水設備がある場合：1 回当りの散水量 10 mm 程度（目安）
 - ・かん水設備のない場合：タンク等で水を運んで根元に集中的にかん水する
* 1 樹当たり 100～200 ㍓程度（目安）
- ②雑草管理 ：短く刈り込みすぎないように注意する。
- ③樹冠下マルチ：敷きわら等を実施する。幹まわり 2 m 範囲中心に。厚さ 5 cm 程度）

2. 日焼け防止

- ①着果位置 ：直射日光が当たる樹冠外周よりも、樹冠内部の果実をなるべく残す。
- ②新梢管理 ：骨格枝背面の新梢は適度に残し、日除け枝として利用する。
* 30～50 cm 間隔に 1 本新梢を残しながら間引く。
- ③白塗剤の塗布：直射日光が当たる骨格枝背面にフジホワイトや農業用白ペンキを塗布する。
- ④寒冷紗の設置：日焼けが心配される園の南～西側に寒冷紗を設置する。

シナノリップ収穫前管理について

1. 収穫予想：中野市 8/5 頃～ *満開後 105 日 収穫は 3 回以上に分けて行う

2. 着色管理：

- ①葉摘み：日焼け対策として必要最低限とする。（7 月中旬～。1 果 2 枚程度まで）
- ②反射マルチ：「タイベック」等を敷く。（収穫 10 日前頃。樹幹内部の着色促進。）

3. 心かび果の判断ポイント *7 月中旬頃から心かび果が園内で確認できます。

- ・異常に早く着色した果実
- ・地色の抜けが異常に早い果実
- ・収穫期に近づくほど、全体的に着色が進み、心かび果かどうかの判断が難しくなります。
まずは、割ってみて心かび果かどうかを確認してください。

問合せ先：園芸課 23-3933

次回発行予定
8/3