

《地区班》 《住__所》

《氏__名》 様

キウイフルーツ特報 No.3

R8.6.16

JA 中野市園芸課

JA 中野市キウイフルーツ研究会

【2026 キウイ生育調査】 間山定点圃場

2026 生育 発芽：4/7 展葉：4/15 開花：5/28 満開：5/31 落花：6/3

生育は平年より1週間ほど進んでいます。

病害虫の防除は、予防を意識し早めの散布を行いましょう

病害虫防除 7月上旬の散布 目安：7月3日頃

		散布日	7月	日
散布薬剤	水	100ℓ 当たり		
	展着剤 (ハイテンパワー)	10ml		
	ダコニール 1000	100ml		
		散布量		ℓ
				(60日前、7回)
対象病害虫	果実軟腐病			
散布量	350ℓ / 10a *若木の場合、樹体にしっかり薬液がかかる量を散布する			
注意事項	① 主幹部のコウモリガ食入は針金等で刺殺する。 ② 【代替】ダコニール 1000 に代えてベンレート水和剤 2,000 倍 (7日前、5回) でも良い。 ③ 【カメムシ対策】カメムシの吸害が心配される場合は、アディオン乳剤 2,000 倍 (7日前、5回) を加用する。			

【夏季管理講習会の開催について】

日時：7月2日(木) 午前10時
集合場所：日野集出荷所
内容：新梢管理について(芽かき、誘引、摘心)
降雹後の着果制限について