

◆ 裏面には西洋梨の定期防除について記載しています。ご確認ください。

和 梨【有袋】定期防除

有袋：第11回 散布薬剤

散布時期	有袋：8/20～25頃（前回から約15日後）	散布日	月	日
散布薬剤	水 100ℓ 当たり 展着剤（ハイテンパワー） 10ml ナリアWDG 50g（前日、3回） 劇バリアード顆粒水和剤 50g（前日、3回）	散布量		ℓ
対象病害虫	黒斑病、輪紋病 シンクイムシ類、カメムシ類、クワコナカイガラムシ			
散布量	10a 当たり：450ℓ			
注意事項	①豊水等の最終散布。 ②ナリアWDGは、ピオーネ、サニールージュに薬害を生じる恐れがあるので、飛散しないよう注意する。			

和 梨【無袋】定期防除

第13回 散布薬剤

散布時期	無袋：8/25～30前後（前回から10日後）	散布日	月	日
散布薬剤	水 100ℓ 当たり 展着剤（ハイテンパワー） 10ml ナリアWDG 50g（前日、3回） テルスター水和剤 100g（前日、2回）	散布量		ℓ
対象病害虫	黒斑病、輪紋病 アブラムシ類、カメムシ類、シンクイムシ類、ハマキムシ類、ハダニ類			
散布量	10a 当たり：450ℓ			
注意事項	①豊水等の最終散布 ②ナリアWDGは、ピオーネ、サニールージュに薬害を生じる恐れがあるので、飛散しないよう注意する。 ③テルスター水和剤に代えて、アーデントフロアブルの2,000倍（前日、3回）でもよい。			

次回特報配布日

9月1日（予定）

西洋梨【有袋・無袋】定期防除について

次面をご覧ください

西 洋 梨【有袋】定期防除

有袋：第 9 回 散布薬剤

有袋：第 9 回 散布薬剤		散布日	月	日
散布時期	有袋：8/20～25 頃 （前回から約 20 日後）	散布量		ℓ
散布薬剤	水 100ℓ 当たり 展着剤（ハイテンパワー） 10ml キノンドー顆粒水和剤 100g （3 日前、9 回） 劇イカズチ WDG 66g （前日、3 回）			
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、カメムシ類、ハダニ類、クワコナカイガラムシ			
散布量	10a 当たり：600ℓ			
注意事項	①オーロラ等の最終散布。 ②ハダニ対策 コロマイト乳剤の 1,000 倍（前日、1 回）を加用する。 ③キノンドー顆粒水和剤に代えて、ベルコートフロアブルの 2,000 倍（14 前、5 回）でもよい。なお、ベルコートフロアブルは、ル・レクチェに薬害を生じるので使用しない。			

西 洋 梨【無袋】定期防除

無袋：第 12 回 散布薬剤

無袋：第 12 回 散布薬剤		散布日	月	日
散布時期	無袋：8/20～25 頃 （前回から約 15 日後）	散布量		ℓ
散布薬剤	水 100ℓ 当たり 展着剤（ハイテンパワー） 10ml キノンドー顆粒水和剤 100g （3 日前、9 回） 劇バリアード顆粒水和剤 50g （前日、3 回）			
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、カメムシ類			
散布量	10a 当たり：600ℓ			