

- ◆ 南水園地で、黒斑病による被害果実を見つけた場合には、除去し園地外にて処理をお願い致します。（次年度への菌密度を減らしましょう）

◆ 【農薬散布時の注意事項】

- ①隣接園・今後収穫期を迎える作物に飛散しないように注意する。
②散布後は、タンク内や散布器具の洗浄を十分に行い、薬剤が残らないよう注意する。

- ◆ 西洋梨【無袋】薬剤散布は裏面をご覧ください。

和 梨 【有袋・無袋】共通定期防除

有袋：第12回 無袋：第14回 散布薬剤

有袋：第 12 回 無袋：第 14 回 散布薬剤		散布日	月	日
散布時期	有袋：9／2～7 頃（前回から約 10 日後） 無袋：9／1～5 頃（前回から約 10 日後）	散布量	ℓ	
散布薬剤	水			

西 洋 梨（有袋）の定期防除

【有袋】：第10回 散布薬剤

西 洋 梨（有袋）の定期防除		散布日 月 日	
【有袋】：第 10 回 散布薬剤		散布量 ℓ	
散布時期	有袋：9／10～15 頃 （前回から約 20 日後）		
散布薬剤	水		

西 洋 梨（無袋）の定期防除

【無袋】：第 13 回 散布薬剤

散布時期	無袋：9/5～10 頃 （前回から約 15 日後）	散布日	月	日
		散布量		ℓ
散布薬剤	水 100ℓ 当たり 展着剤（ハイテンパワー） 10ml ベルクートフロアブル 50ml（14 日前、5 回）収穫前規制に注意 テルスター水和剤 100g（前日、2 回）			
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、ハマキムシ類、ケムシ類			
散布量	10a 当たり：600ℓ			
	①【代替】ベルクートフロアブルに代えて、キノンドー顆粒水和剤 1,000 倍（3 日前、9 回）でもよい。 ②ベルクートフロアブルは、ル・レクチェに薬害を生じるため使用しない。 ③【代替】テルスター水和剤に代えて、アーデントフロアブルの 2,000 倍（前日、3 回）でもよい。			

【無袋】：第 14 回 散布薬剤

散布時期	無袋：9/15～20 頃 （前回から約 10 日後）	散布日	月	日
		散布量		ℓ
散布薬剤	水 100ℓ 当たり 展着剤（ハイテンパワー） 10ml ストロビードライフフロアブル 50g （前日、3 回）			
対象病害虫	輪紋病			
散布量	10a 当たり：600ℓ			
	①ラ・フランス等の最終散布。 ②シンクイムシ類対策 ダントツ水溶剤の 2,000 倍（前日、3 回）を加用する。			