

ナシ特報 ③【訂正版】

令和8年4月
JA中野市園芸課
JA中野市ナシ部会

4/17に配布したナシ特報 No③ですが、散布日の目安に誤りがありました。

大変お手数をおかけしますが、訂正版を目安に薬剤散布を進めていただきたいと思います。

なお、ナシ特報 No④につきましては、5/1に配布を予定しています。

和 梨 第4回 散布薬剤（前回から15日後）

散布時期	目安：4/25～30頃	散布日	月	日
散布薬剤	水 100ℓ当たり 展着剤（ハイテンパワー） 10ml 劇カナメフロアブル 25ml（前日、3回）	散布量	ℓ	
対象病害虫	黒斑病、黒星病、赤星病			
散布量	10a当たり：350ℓ			
注意事項	① アブラムシ類対策 ウララDFの2,000倍（14日前、2回）を加用する。 ② 葉色が薄い場合や黄化が見られる園は、リーフマグ 1,000倍又はグリーンデイズ 1,000倍を加用する。 ③ カナメフロアブルは劇物です。購入の際は印鑑をお持ちください。			

西洋梨 第3回 散布薬剤（前回から15日後）

散布時期	目安：4/25～30頃	散布日	月	日
散布薬剤	水 100ℓ当たり 展着剤（ハイテンパワー） 10ml 劇モスピラン顆粒水溶剤 25g（前日、3回） トップジンM水和剤 100g（前日、6回）	散布量	ℓ	
対象病害虫	輪紋病、腐らん病、胴枯病、アブラムシ類、カメムシ類、シンクイムシ類			
散布量	10a当たり：400ℓ			
注意事項	① 訪花昆虫保護のため、指定薬剤以外散布しない。 ② モスピラン顆粒水溶剤は劇物です。購入の際は印鑑をお持ちください。			