

ナシ特報

③

令和8年4月17日

J A中野市園芸課

J A中野市ナシ部会

※参考 (南水：長丘地区 生育調査表)

年度	平年	R4	R5	R6	R7	R8 (予想)
開花	4/19	4/21	4/10	4/17	4/21	4/14ごろ
満開	4/22	4/25	4/13	4/20	4/24	4/17ごろ

和梨 第4回 散布薬剤 (前回から15日後)

散布時期	目安：5/5 ~ 10頃	散布日	月	日
散布薬剤	水 100ℓ当たり 展着剤 (ハイテンパワー) 10ml 劇カナメフロアブル 25ml (前日、3回)	散布量		ℓ
対象病害虫	黒斑病、黒星病、赤星病			
散布量	10a当たり：350ℓ			
注意事項	① アブラムシ類対策 ウララDFの2,000倍(14日前、2回)を加用する。 ② 葉色が薄い場合や黄化が見られる園は、リーフマグ 1,000倍又はグリーンデイズ 1,000倍を加用する。 ③ カナメフロアブルは劇物です。購入の際は印鑑をお持ちください。			

※参考 (ラ・フランス：平岡地区 生育調査表)

年度	平年	R4	R5	R6	R7	R8 (予想)
開花	4/20	4/23	4/10	4/17	4/23	4/16ごろ
満開	4/23	4/26	4/13	4/20	4/26	4/18ごろ

西洋梨 第3回 散布薬剤 (前回から15日後)

散布時期	目安：5/5 ~ 10頃	散布日	月	日
散布薬剤	水 100ℓ当たり 展着剤 (ハイテンパワー) 10ml 劇モスピラン顆粒水溶剤 25g (前日、3回) トップジンM水和剤 100g (前日、6回)	散布量		ℓ
対象病害虫	輪紋病、腐らん病、胴枯病、アブラムシ類、カメムシ類、シンクイムシ類			
散布量	10a当たり：400ℓ			
注意事項	① 訪花昆虫保護のため、指定薬剤以外散布しない。 ② モスピラン顆粒水溶剤は劇物です。購入の際は印鑑をお持ちください。			

次回特報配布日

5月1日(予定)