

ナシ特報

③

令和6年5月2日
JA中野市営農センター
JA中野市ナシ部会

※参考 (南水：長丘地区 生育調査表)

年度	平年	R3	R4	R5	R6
開花	4/21	4/13	4/21	4/10	4/17
満開	4/24	4/19	4/25	4/13	4/20

和梨

第4回 散布薬剤 (前回から15日後)

散布時期	目安：5/1～6頃	散布日	月	日
散布薬剤	水 100ℓ当たり 展着剤 (ハイテンパワー) 10ml 劇カナメフロアブル 25ml (前日、3回)	散布量	ℓ	
対象病害虫	黒斑病、黒星病、赤星病			
散布量	10a 当たり：350ℓ			
注意事項	① アブラムシ類対策 ウララDFの2,000倍(14日前、2回)を加用する。 ② 葉色が薄い場合や黄化が見られる園は、リーフマグ 1,000倍又はグリーンデイズ 1,000倍を加用する。			

第5回 散布薬剤 (前回から15日後)

散布時期	目安：5/15～20頃	散布日	月	日
散布薬剤	水 100ℓ当たり 展着剤 (ハイテンパワー) 10ml トレノックスフロアブル 200ml (30日前、5回) トランスフォームフロアブル 50ml (前日、3回)	散布量	ℓ	
対象病害虫	黒斑病、黒星病、赤星病、アブラムシ類、カイガラムシ類			
散布量	10a 当たり：350ℓ			
注意事項	① 葉色が薄い場合や黄化が見られる園は、リーフマグ 1,000倍又はグリーンデイズ 1,000倍を加用する。			

【西洋梨の定期防除】については次面に記載

西洋梨

※参考 (ラ・フランス：長丘地区 生育調査表)

年度	平年	R3	R4	R5	R6
開花	4/22	4/13	4/23	4/10	4/17
満開	4/25	4/18	4/26	4/13	4/20

第3回 散布薬剤 (前回から15日後)

散布時期	目安：5/3 ~ 8頃	散布日	月	日
散布薬剤	水 100ℓ 当たり 展着剤 (ハイテンパワー) 10ml 劇モスピラン顆粒水溶剤 25g (前日、3回) ベンレート水和剤 50g (前日、4回)	散布量	ℓ	
対象病害虫	輪紋病、胴枯病、アブラムシ類、カメムシ類、シンクイムシ類			
散布量	10a 当たり：400ℓ			
注意事項	① 訪花昆虫保護のため、指定薬剤以外散布しない。 ② モスピラン顆粒水溶剤は劇物です。購入の際は印鑑をお持ちください。			

第4回 散布薬剤 (前回から15日後)

散布時期	目安：5/15 ~ 20頃	散布日	月	日
散布薬剤	水 100ℓ 当たり 展着剤 (ハイテンパワー) 10ml トランスフォームフロアブル 50ml (前日、3回) シマンダイセン水和剤 200g (30日前、5回)	散布量	ℓ	
対象病害虫	輪紋病、アブラムシ類、カイガラムシ類			
散布量	10a 当たり：400ℓ			
注意事項	① アブラムシ類の発生が目立つ場合は、今回の散布を早める。			

次回特報配布日

5月17日 (予定)