

ナシ特報

⑦

令和7年6月17日

J A中野市園芸課

J A中野市ナシ部会

◆ 次面には西洋梨の定期防除について記載しています。ご確認ください。

和 梨 【有袋】 定期防除

第8回 散布薬剤

第 8 回 散布薬剤		散布日	月	日
散布時期	有袋：7／5～10 頃（前回から約 15 日後）		散布量	ℓ
散布薬剤	水 100ℓ 当たり 展着剤（ハイテンパワー） 10ml 劇 バイスロイドEW 50ml （7 日前、2 回） ロブドー水和剤 125 g （14 日前、5 回）			
対象病害虫	黒斑病、黒星病 シンクイムシ類、アブラムシ類、ハマキムシ類			
散布量	10a 当たり：450 ℓ			
注意事項	①【代替】ロブドー水和剤に代えて、キノンドー顆粒水和剤の 1,000 倍（3 日前、9 回）でもよい。 ②【代替】通常展着剤に代えて、固着性展着剤のアピオンE の 2,000 倍を使用すると薬液付着効果が高まる。 ③【代替】バイスロイドEW に代えて、アーデントフロアブル 2,000 倍（前日、3 回）でもよい。			

和 梨 【無袋】 定期防除

第9回 散布薬剤

第9回 散布薬剤		散布日	月	日
散布時期	無袋：7/5～10頃（前回から10日後）		散布量	ℓ
散布薬剤	水 100ℓ 当たり 展着剤（ハイテンパワー） 10ml ベルコートフロアブル 50ml （14日前、5回）			
対象病害虫	黒斑病、黒星病、輪紋病			
散布量	10a 当たり：450ℓ			
注意事項	①【代替】 通常展着剤に代えて、固着性展着剤のアピオンEの2,000倍を使用すると薬液付着効果が高まる。			

次回特報配布日

7月2日（予定）

西洋梨【有袋・無袋】定期防除について

裏面をご覧ください

西 洋 梨【有袋】 特別散布

特別散布薬剤

散布時期	7/1～5 頃（前回から約 10 日後）	散布量	ℓ
散布薬剤	水 展着剤（ハイテンパワー） オキシラン水和剤	100ℓ 当たり 10ml 200g（3 日前、9 回）	
対象病害虫	輪紋病		
散布量	10a 当たり：600ℓ		
注意事項	輪紋病対策 袋掛けが遅れている場合は、今回の特別散布を実施する。散布時期は前回から 10 日後を目安とする。		

※【西洋梨有袋】次回定期防除の散布薬剤は、以下の通りです。（詳細は、次回特報参照）

散布目安：7/10～15 頃

- ・バイスロイド EW2,000 倍（7 日前、2 回）
- ・ナリア WDG2,000 倍（前日、3 回）

西 洋 梨【無袋】 定期防除

第 8 回 散布薬剤

散布時期	7/1～10 頃（前回から 10 日後）	散布量	ℓ
散布薬剤	水 100ℓ 当たり 展着剤（ハイテンパワー） 10ml 劇 バイスロイド EW 50ml（7 日前、2 回） ナリア WDG 50g（前日、3 回）		
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、ハマキムシ類、アブラムシ類		
散布量	10a 当たり：600ℓ		
注意事項	①ナリア WDG は、ぶどう（ピオーネ、サニールージュ）に薬害を生じる恐れがあるため飛散しないよう注意する。		