

ナシ特報

⑨

令和7年7月17日

JA中野市園芸課

JA中野市ナシ部会

◆ 裏面には西洋梨の定期防除について記載しています。ご確認ください。

和梨【有袋・無袋】共通定期防除

有袋：第10回 無袋：11回 散布薬剤

散布時期	無袋：7/25～30頃（前回から約10日後） 有袋：8/5～10頃（前回から約15日後）	散布日	月	日
散布薬剤	水 100ℓ当たり 展着剤（ハイテンパワー） 10ml コロマイト乳剤 100ml（前日、1回） ベルコートフロアブル 50ml（14日前、5回） 劇イカズチWDG 66g（前日、3回）	散布量		ℓ
対象病害虫	黒斑病、黒星病、輪紋病 シンクイムシ類、カメムシ類、ハダニ類			
散布量	10a当たり：450ℓ			
注意事項	①有袋：幸水等の最終散布。 ②早生種等【代替】ベルコートフロアブルに代えて、キノンドー顆粒水和剤の1,000倍（3日前、9回）でもよい。			

和梨【無袋】定期防除

第12回 散布薬剤

散布時期	無袋：8/5～10前後（前回から10日後）	散布日	月	日
散布薬剤	水 100ℓ当たり 展着剤（ハイテンパワー） 10ml 劇バリアード顆粒水和剤 50g（前日、3回）	散布量		ℓ
対象病害虫	アブラムシ類、カメムシ類、シンクイムシ類			
散布量	10a当たり：450ℓ			
注意事項	①幸水等の最終散布			

次回特報配布日

8月1日（予定）

西洋梨【有袋・無袋】定期防除について

次面をご覧ください

西洋梨【有袋】定期防除

有袋：第8回 散布薬剤

		散布日	月	日
散布時期	有袋：8/1～5頃（前回から約20日後）	散布量		ℓ
散布薬剤	水 100ℓ 当たり 展着剤（ハイテンパワー） 10ml マイトコーネフロアブル 100ml（前日、1回） キノンドー顆粒水和剤 100g（3日前、9回） 劇バリアード顆粒水和剤 50g（前日、3回）			
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、カメムシ類、ハダニ類、クワコナカイガラムシ			
散布量	10a 当たり：600ℓ			

西洋梨【無袋】定期防除

無袋：第11回 散布薬剤

		散布日	月	日
散布時期	無袋：8/10前後（前回から約15日後）	散布量		ℓ
散布薬剤	水 100ℓ 当たり 展着剤（ハイテンパワー） 10ml キノンドー顆粒水和剤 100g（3日前、9回） 劇イカズチWDG 66g（前日、3回）			
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、カメムシ類			
散布量	10a 当たり：600ℓ			
	①ハダニ類対策：コロマイト乳剤の1,000倍（前日、1回）を加用する。 ②キノンドー顆粒水和剤に代えて、ベルコートフロアブル2,000倍（14日前、5回）でもよい。なお、ベルコートフロアブルは、ル・レクチェに薬害を生じるので使用しない。			