

プラム・プルーン特報 No.10

令和7年7月17日

J A中野市園芸課

J A中野市プラム部会

●紅りょうぜんの出荷開始予想は、7/13、静香の収穫開始予想は、7/16 で、平年並みで推移しておりますが、連日の高温で成熟が進み、収穫遅れが心配されます。園地の成熟状況を良く確認し、適期収穫に努めてください。

●スモモヒメシンクイ第1世代の発生がピークを迎えていて、例年よりも、果実被害が多い状況です。つきましては10日間隔以内の薬剤散布を徹底し、被害果実は園外で処分して下さい。

プラム【第12回 定期防除】

対象病害虫：灰星病（すす点病）アブラムシ類（シンクイムシ類）

散布時期	・7月24日～8月2日（第11回定期散布から10日後）	
散布薬剤	水 100ℓ当り	【定期散布】散布日 ____月 ____日（ ） 散布量 _____ℓ
	展着剤（まくぴか） 20mℓ	
	フリントフロアブル 25 50mℓ（前日、2回）	
	劇バリアード顆粒水和剤 50g（前日、2回）	
散布量	500ℓ／10a	
注意事項	①【黒斑病(かいよう病)対策】 バリダシン液剤5の500倍（3日前、4回）を加用する。	

プラム【第13回 定期防除】 対象病害虫：シンクイムシ類

散布時期	・8月3日～8月12日（第12回定期散布から10日後）	
散布薬剤	水 100ℓ当り	【定期散布】散布日 ____月 ____日（ ） 散布量 _____ℓ
	展着剤（まくぴか） 20mℓ	
	劇イカズチ WDG 66g（前日、2回）	
散布量	500ℓ／10a	

プルーン（第9回定期防除）は次面に記載

2. プルーン

【第9回 定期防除】対象病害虫：灰星病（すす点病）アブラムシ類（シンクイムシ類）

散布時期	・7月24日～8月3日（第8回定期散布から10日後）		
散布薬剤	水 100ℓ当り		【定期散布】散布日 ____月 ____日（ ____ ） 散布量 ____ ℓ
	フリントフロアブル 25 50mℓ（前日、2回）		
	劇バリアード顆粒水和剤 50g（前日、2回）		
散布量	500ℓ / 10a		
注意事項	①【ハダニ類対策】 カネマイトフロアブルの1,000倍（3日前、1回）を加用する。		

●スモモヒメシンクイ フェロモントラップ調査結果について

＊第1世代が増加傾向です。防除間隔10日以内での薬剤散布を徹底して下さい。

＊調査機関：北信農業農村支援センター 数字はスモモヒメシンクイ成虫の誘殺数

年	一本木		倭	
2025年	R7	R6	R7	R6
5月14日	28	14	25	32
5月21日	47	28	193	56
5月28日	18	11	38	17
6月4日	33	2	12	2
6月11日	32	14	5	3
6月18日	7	3	2	8
6月25日	26	14	22	27
7月2日	44	28	82	8
7月9日	37	26	137	57

次回特報発行予定日：8月上旬頃 問合先：園芸課・担当 横田（080-5147-8257）