

プラム・プルーン特報 No.11

令和7年8月1日
 JA中野市園芸課
 JA中野市プラム部会

- 本年は収穫開始から果肉軟化が早いです。
 収穫期を迎えた品種は、収穫遅れのないように日々園地確認お願い致します。
- スモモヒメシンクイの発生が散見されます。第2世代が8月上旬頃に発生的高峰を迎えると予想されます。引き続き、10日間隔以内の薬剤散布を徹底し被害果実は園外で処分して下さい。

プラム【第14回 定期防除】

対象病害虫：灰星病（すす点病）ハダニ類、シンクイムシ類（ケムシ類）

散布時期	・ 8 月 13 日～8 月 22 日 （第 13 回定期散布から 1 0 日後）		
散布薬剤	水 1 0 0 ℓ 当り		【定期散布】 散布日 ____ 月 ____ 日 (____) 散布量 _____ ℓ
	展着剤（まくぴか） 2 0 m ℓ		
	パレード 15 フロアブル	5 0 m ℓ （前日、2 回）	
	アーデントフロアブル	5 0 m ℓ （前日、3 回）	
散布量	5 0 0 ℓ ／ 1 0 a		

プラム【第15回 定期防除】 対象病害虫：灰星病、シンクイムシ類

散布時期	・ 8 月 23 日～9 月 1 日 （第 1 4 回定期散布から 1 0 日後）		
散布薬剤	水 1 0 0 ℓ 当り		【定期散布】 散布日 ____ 月 ____ 日 (____) 散布量 ____ ℓ
	展着剤（まくぴか） 2 0 m ℓ		
	劇モスピラン顆粒水溶剤	5 0 g （前日、3 回）	
	オンリーワンフロアブル	5 0 m ℓ （前日、3 回）	
散布量	5 0 0 ℓ / 1 0 a		
注意事項	果粉溶脱、果実汚れが心配される場合は、モスピラン顆粒水溶剤に代えてエクシレル S E の 2 5 0 0 倍（前日、3 回）を使用する。		

次面もご覧ください

2. プルーン

【第 10 回 定期防除】対象病虫害：灰星病、ハダニ類、シンクイムシ類

散布時期	・ 8 月 4 日～8 月 13 日 （第 9 回定期散布から 10 日後）		
散布薬剤	水 100ℓ 当り		【定期散布】 散布日 ____ 月 ____ 日 (____) 散布量 _____ ℓ
	パレード 15フロアブル	50ml	（前日、2回）
	アーデントフロアブル	50ml	（前日、3回）
散布量	500ℓ / 10a		

【第 11 回 定期防除】対象病虫害：灰星病、シンクイムシ類、ケムシ類

散布時期	・ 8 月 14 日～8 月 23 日 （第 10 回定期散布から 10 日後）		
散布薬剤	水 100ℓ 当り		【定期散布】 散布日 ____ 月 ____ 日 (____) 散布量 _____ ℓ
	オンリーワンフロアブル	50ml	（前日、3回）
	エクシレルSE	40ml	（前日、3回）
散布量	500ℓ / 10a		
注意事項	【晩生種 灰星病・シンクイムシ類対策】 9月上旬に、オーシャインフロアブルの 3,000 倍（前日、3回）と Ⓢモスピラン顆粒水溶剤の 2,000 倍（前日、3回）を特別散布する。		

●スモモヒメシンクイ フェロモントラップ調査結果について

年	一本木		倭	
2025 年	R7	R6	R7	R6
6 月 25 日	26	14	22	27
7 月 2 日	44	28	82	48
7 月 9 日	37	34	130	57
7 月 16 日	17	15	68	27
7 月 23 日	15	8	29	20

* 調査機関：北信農業農村支援センター 数字はスモモヒメシンクイ 成虫の誘殺数

次回特報発行予定日：8 月中旬頃 問合先：園芸課・担当 横田（080-5147-8257）