

令和6年3月29日
J A中野市営農センター
J A中野市プラム部会

開花予想(南部) 4/10 頃～ (北部)4/13 頃～ 授粉作業、凍霜害対策は万全に
3月中旬以降も平均気温が平年より 1℃低く推移し、生育は平年並みかやや遅れる予想です。
先ずは結実確保が第一ですので、授粉作業・凍霜害対策を徹底して下さい。

1. プラム 【第3回 定期防除】 対象病害虫：灰星病、黒斑病、かいよう病

散布時期	・落花後（南部4/25 頃～、北部 4/28 頃～：樹全体の花が 80～90%散った頃）		
散布薬剤	水 100ℓ 当り 展着剤（ハイテンパワー） 10mℓ スコア顆粒水和剤 33g アグレプト水和剤 100g	散布日 月 日 散布量 ℓ	
散布量	10aあたり 400ℓ		
注意事項	①【アブラムシ 対策】ウララDF（7日前、2回）の2000倍を加用する。		

2. プルーン 【第2回 定期防除】 対象病害虫：灰星病、ケムシ類、シンクイムシ類

散布時期	・落花後（4月下旬：樹全体の花が 80～90%散った頃）		
散布薬剤	水 100ℓ 当り 展着剤（ハイテンパワー） 10mℓ スコア顆粒水和剤 33g	散布日 4月 日 散布量 ℓ	
散布量	10aあたり 400ℓ		
注意事項	①【コスカシバ対策】 フェニックスフロアブルの200倍（開花期まで、1回・10aあたり 5～200ℓ）を樹幹部及び主枝に散布する。 ②【ケムシ類対策】 サムコフロアブル10の2,500倍(3日前、3回)を加用する。		

次面もご覧ください

3. 人工授粉（相互交配）のポイント

***時間帯**：10 時～15 時頃

***条 件**：風のない暖かい日（昼間の気温が 20℃以上）が望ましい

＊好条件の日が少ないので、授粉はこまめに実施する。

*授粉作業は、主に「毛ばたき」を使用する。

*毛ばたきの状態を確認し、微細毛が劣化している場合は、買い替えを検討してください。

【毛ばたき 使用方法】

①授粉樹の花から毛ばたきに花粉を付ける。この時、なでるように優しく転がす。

②次に受粉したい品種の花に、軽くなでるように転がす。（①と②の繰り返し）

＊授粉作業した花が分かりにくいため、丁寧な授粉を心がけてください。

＊無理に花に押し付けたり強く激しく動かすと、花を傷める場合があります。

毛ばたきのご案内（JA資材店）

商品名	サイズ	通常価格
ケバタキ	60cm	8,860 円
ケバタキSK-30	40cm	4,470 円
ケバタキSK-100	18cm	1,980 円

次回特報発行予定日：4月16日（予定）

問合せ先：園芸課・担当 横田（080-5147-8257）