

プラム・プルーン特報 No.4

令和8年4月17日
JA中野市園芸課
JA中野市プラム部会

4/9 低温遭遇、長丘地区で-0.3℃計測被害無し。

引き続き凍霜害の備えを万全にしてください。平岡太陽満開4/11

4月6日に長丘観測所にて最高気温25℃を記録し、生育が一気に前進しました。

生育は、昨年よりも5~7日程度進んでいる状況です。引き続き凍霜害の危険がありますので、今後も気象情報に十分注意し、防霜対策に備えて下さい。

1. プラム【第4回 定期防除】対象病虫害：黒斑病（かいよう病）シンクイムシ類、

ケムシ類

散布時期	・5月上旬（第3回定期散布（落花後）から10日後）
散布薬剤	水 100ℓ当り 展着剤（ハイテンパワー）10mℓ エクシレルSE 20mℓ（前日、3回） マイコシールド 50g（21日前、3回）
散布量	10aあたり 400ℓ
注意事項	① 【アブラムシ類対策】ウララDFの2,000倍（7日前、2回）を加用する。 ② 5月末までの農薬散布は、葉・果実とも軟弱であり、（時間帯・薬液量等）十分注意する。

【定期散布】散布日
____月 ____日（ ____ ）
散布量
_____ℓ

2. プルーン

プルーンの第3回定期防除は、次号（5月1日発行、プラム・プルーン特報No.5）に掲載します。

裏面も必ずご覧ください

3. 「毛バタキ」の保管方法について（授粉期間終了後）

- ① 毛バタキに残った花粉やホコリ等を十分に掃除する。
 - ・コンプレッサーがあれば、エアーの力で残った花粉やホコリ等を掃除する。
 - ・中性洗剤、ぬるま湯で軽くもみ洗いし、よく濯ぐ。
- ② 直射日光を避け、「日陰干し」を行ない、十分乾燥させる。
 - ・直射日光に当てると繊毛（センモウ）がくっ付いてしまいます。
- ③ 密封が可能な袋や箱に毛バタキを入れ、市販の防虫剤を入れてから密封し、
湿気のない場所で保管する。（高温多湿を避ける）

次回特報発行予定日：5月1日

問合せ先：園芸課・担当 横田（080-5147-8257）