

プラム・プルーン特報 No.7

令和8年6月1日
JA中野市園芸課
JA中野市プラム部会

摘果作業お疲れ様です。生育状況は、昨年よりも4~5日進んでいると思われます。

結実した果実を無事に収穫できるよう、今後の管理作業・防除の徹底をお願いします。

引き続き、シンクイムシ類の重点防除となります。授粉樹も含め、死角がないように散布しましょう。プラム第7回定期散布、6月上旬（シンクイムシ類対策強化）としてサイアノックス水和剤も使用可能です。資材課に多数の在庫ありますので、ご購入お願い致します。

1. プラム【第8回 定期防除】（2回分の防除を掲載）

対象病害虫：灰星病、シンクイムシ類、ケムシ類

散布時期	・6月12日~6月21日（第7回定期散布から10日後）		
散布薬剤	水 100ℓ当り		【定期散布】散布日 ____6月____日(____) 散布量 _____ℓ
	展着剤（まくぴか） 20ml		
	ベルコートフロアブル 50ml（3日前、3回） エクシレルSE 40ml（前日、3回）		
散布量	500ℓ / 10a		
注意事項	①【黒斑病(かいよう病)対策] バリダシン液剤5の500倍（3日前、4回）又は スターナ水和剤の1,000倍（7日前、3回）を加用する。		

●スモモヒメシンクイ フェロモントラップ調査結果について

年	一本木		倭	
2026年	R8	R7	R8	R7
4月30日	5	2	21	0
5月7日	9	0	53	2
5月14日	17	28	71	25
5月21日	25	47	13	193

プラム【第9回 定期防除】

対象病害虫：灰星病、アブラムシ類、シンクイムシ類、

散布時期	・ 6月22日～7月1日 (第8回定期散布から10日後)	
散布薬剤	水 100ℓ当り	【定期散布】散布日 __月__日() 散布量 _____ℓ
	展着剤 (ハイテンパワー) 10mℓ	
	オンリーワンフロアブル 50mℓ (前日、3回)	
	劇バリアード顆粒水和剤 50g (前日、2回)	
散布量	500ℓ / 10a	
注意事項	①【黒斑病(かいよう病)対策] バリダシン液剤5の500倍(3日前、4回)又は スターナ水和剤の1,000倍(7日前、3回)を加用する。	

2. プルーン

【第5回 定期防除】対象病害虫：灰星病、炭そ病、アブラムシ類、(シンクイムシ類)

散布時期	・ 6月6日～6月15日 (第4回の散布から14日後)	
散布薬剤	水 100ℓ当り	【定期散布】散布日 __6月__日() 散布量 _____ℓ
	展着剤 (ハイテンパワー) 10mℓ	
	フリントフロアブル25 50mℓ (前日、2回)	
	劇バイスロイドEW 33mℓ (14日前、2回)	
散布量	500ℓ / 10a	

次回特報発行予定日：6月17日

問合先：園芸課・担当 横田 (080-5147-8257)