

プラム・プルーン特報 No.9

令和 7 年 7 月 2 日
JA 中野市園芸課
JA 中野市プラム部会

☆生育は、「南部地域」で平年並みに推移してます。（大石早生 収穫開始時点）
☆6/10 日に梅雨入りしました。平年と比べて 3 日遅い梅雨入りになりました。
今後は、高温・降雨により「シンクイムシ類」や「黒斑病」の発生が増加する時期です。
引き続き、10 日間隔以内の防除を徹底し、薬液が果実に十分かかるよう散布量して下さい。
☆新梢伸長が旺盛な園地が散見されます。樹冠内部まで光が入るよう、また、薬液が届くよう、
新梢管理を実施して下さい。（徒長枝の切除・捻枝・枝吊り・支柱立てなど）
☆シナノパールの仕上げ摘果、笠掛けは7月上旬までに完了させてください。

1. プラム【第 11 回 定期防除】

対象病虫害：シンクイムシ類、ケムシ類

散布時期	・ 7 月 14 日～7 月 23 日 （第 10 回定期散布から 10 日後）	
散布薬剤	水 100ℓ 当り 展着剤（まくぴか） 20mℓ ヨーバルフロアブル 20mℓ （前日、2 回）	【定期散布】 散布日 ____ 月 ____ 日（ ____ ） 散布量 _____ ℓ
散布量	500ℓ / 10a	
注意事項	①【黒斑病(かいよう病)対策】 バリダシン液剤 5 の 500 倍（3 日前、4 回）又は スターナ水和剤 1,000 倍（7 日前、3 回）を加用する。	

プルーン（第 8 回定期防除）は次面に記載

2. プルーン

【第8回 定期防除】対象病害虫：灰星病、シンクイムシ類、（ケムシ類）

散布時期	・7月14日～7月23日（第7回定期散布から10日後）		
散布薬剤	水 100ℓ当り	【定期散布】散布日 ____月 ____日（ ____ ） 散布量 ____ ℓ	
	オンリーワンフロアブル	50mℓ	（前日、3回）
	劇イカズチ WDG	66g	（前日、2回）
散布量	500ℓ / 10a		
注意事項	①今回以降、果粉(ブルーム)溶脱防止及び果実汚染防止のため展着剤は使用しない。		

●スモモヒメシンクイ フェロモントラップ調査結果について

越冬世代の発生は落ち着きましたが、6月下旬から第一世代は増えてきますので、引き続き注意が必要です。薬剤散布10日以内の防除を徹底してください。

年	一本木		倭	
2025 年	R7	R6	R7	R6
5 月 14 日	28	14	25	32
5 月 21 日	47	28	193	56
5 月 28 日	18	11	38	17
6 月 4 日	33	2	12	2
6 月 11 日	32	14	5	3
6 月 18 日	7	3	2	8
6 月 25 日	26	14	22	27

* 調査機関：北信農業農村支援センター 数字はスモモヒメシンクイ成虫の誘殺数

次回特報発行予定日：7月中旬頃 問合先：園芸課・担当 横田（080-5147-8257）