

《地区班》 《住所》

《氏_名》 様

R8.4.17

J A 中野市園芸課

J A 中野市柿研究会



柿 特報 No.2

定期散布を徹底し、高品質な柿を生産しましょう！

生育は昨年より11日程度早まっています。病害虫の防除は予防を意識し、早めの散布を心がけてください。また、5月に入り高温が続くと害虫の早期発生が予想されますので、防除の徹底をお願い致します。

病害虫防除

中野市管内：発芽日 3/29

(昨年比-11)

◎5月上旬（5月5日頃まで）の薬剤散布

●収穫前や収穫中の作物に飛散しないよう、十分注意する。

散布薬剤	水	100ℓあたり	散布日 月 日
	展着剤（ハイテンパワー）	10ml	散布量 ℓ
	サムコルフロアブル 10	20ml	(前日、3回以内)
対象病害虫	ハマキムシ類、カキノヘタムシガ、ケムシ類、ハスモンヨトウ		
散布量	10a当り 400ℓ *若木の場合、樹体に十分かかる量を散布する。		
注意事項	①主幹害虫（カキノキマダラメイガ・ヒメコスカシバ）の発生がある場合は、ガットサイドの1.5倍液（45日前、2回）を主幹部・主枝及び亜主枝の分枝部に塗布する。目安：100～1,000 ml/樹		

次回（予定）：5/15