降雹・強風被害対策特報 2025・5 月

公開日：令和７年５月 23 日
JA 中野市園芸課

5/21 の降雹・強風により、多大な被害が発生しました。被害に見舞われた組合員の皆様のお見舞い申し上げます。被害後の対策例について下記をおよみください。

←ぶどう枝折れ被害

降雹時間：5/21　17：45～50 頃　＊約５分間・雨混じりの大粒の雹

強風：5/21　17：56　18.1m/s（南西）

雨量：18：00　2.5 ㎜・19：00　3.0 ㎜　＊各時間帯の雨量

推定被害地区：中野・日野・延徳・平野・平岡

災害対策本部設置：5/21 午後６時

プラム果実被害→

被害状況

ぶどう：新梢折れ・葉の穴あき　等　　立ち木：果実打撲・生傷・葉の穴あき等

野菜：苗欠損・葉の穴あき等　　花：葉の穴あき等　　ハウス：ビニール剥がれる・欠損　等

①ぶどう

- 新梢に穴が空き、一部新梢が折れている場合：オーソサイド水和剤 800 倍を特別散布する・枯死している部分の摘心
- 新梢が激しく欠損し、葉も多く欠損している場合：オーソサイド水和剤 800 倍にメリット青の 300 倍又はオルガミン DA の 1000 倍を加用して特別散布する・枯死している所の摘心
- 被害部があれば摘心を行い、副梢の伸長を促し、葉枚数を確保する
- 花穂は被害がなければ基本的には残す
- 誘引は急がず、副梢の伸長程度等を確認しながら適宜行う
- 葉が取れたり新梢が折損し、葉枚数が特に不足している園ではかん水を行う
- 葉の被害が大きい場合は、当年の最終着房量を少なめとする

②立ち木

- 特別散布

  りんご：トレノックスフロアブル 500 倍、ジマンダイセン水和剤 500 倍　等

  もも：トレノックスフロアブル 500 倍　等

  なし：トレノックスフロアブル 500 倍、アントラコール果粒水和剤 500 倍　等

  プラム：ベルクートフロアブル 2,000 倍　等

- 定期防除が済んでいない場合は、日を繰り上げて定期防除を行う
- 摘果が終了していない園地：摘果を２～３日見合わせ、傷の様子がはっきり確認できるようになってから実施する
  できるだけ傷の少ないもの、小さいものや浅いものを残す
- 摘果が終了している園地：雹害果を摘果せず、しばらく様子をみる

③野菜

- 特別散布：被害程度中以下はコサイド 3000 等
- 定植直後又は被害程度大のものは予備苗等で植え直しを行う
- 収穫中（立茎前）の若茎は、被害茎を早めに除去し、新しい萌芽を促す

④花

- 特別散布：アフェットフロアブル、ポリオキシン AL 水溶剤、ダコニール 1000 等
- 花蕾が被害を受けているものは花蕾を取り除き、株養成用の茎とし切花出荷後に予防的に農薬を散布する