



# ぶどう特報 #4



2024年5月1日  
JA 中野市園芸課  
JA 中野市ぶどう部会

露地の発芽は平年より3~5日程度早い状況です(昨年比+4~6)。近年、展葉期前半は進度が不安定な傾向ですが、主要病害の初期密度抑制のため、生育ステージを確認して適期散布に努めてください。

年度	巨峰発芽	シャイン発芽	巨峰開花	シャイン開花	特記
平年	4/25	4/28	6/5	6/12	過去10年平均値
2023 (R5)	4/16	4/19	6/7	6/13	5月の低温で開花停滞。平年比+1~2。
2024 (R6)	4/22	4/23	6/2頃	6/7頃	発芽時点平年比-3~5日。

## 【5月上旬 第3回 定期散布 \*対象：シャインマスカット・クイーンルージュ®等】

		巨峰・ナガノパープル等	
散布時期	展葉3枚目頃 <u>*生育状況を確認して散布</u> シャインマスカット他散布目安：5/3~7頃(巨峰他は1日程度早い)	散布日：__月__日 散布量：_____ℓ	
散布薬剤	水	100ℓ	シャインマスカット・クイーンルージュ®等
	展着剤(ハイテンパワー)	10 ml	
	トレノックスフロアブル	100 ml (60日前・2回)	散布日：__月__日 散布量：_____ℓ
散布量	300ℓ/10a		
適用病害虫	黒とう病、べと病、晩腐病		
注意事項	散布適期：園内の3割程度が右写真の状態に到達した頃 ↓  		

8月上旬に栽培日誌の配布があるまでは、ぶどう特報などに散布日・散布量を記録し、保管してください。

裏面もお読みください。

【5月中旬の定期散布 \*共通】

散布時期	展葉6枚目頃 <u>*生育状況を確認して散布</u> (巨峰他は1日程度早い)		
	シャインマスカット他散布目安 5/14~18頃		
散布薬剤	水	100ℓ	巨峰・ナガノパープル他 散布日：5月____日 散布量：____ℓ
	展着剤 (ハイテンパワー)	10 ml	シャインマスカット他 散布日：5月____日 散布量：____ℓ
	⑧ダイアジノン水和剤 34	100 g (30日前、2回)	
	オーソサイド水和剤 80	125 g (30日前、3回)	
	*グリーンデイズ 等 100 g (*葉面散布剤 詳しくは下記に記載)		
散布量	300ℓ/10a		
適用病害虫	べと病、灰色カビ病、晩腐病、黒とう病、クワコナカイガラムシ若齢幼虫		
注意事項	① 展葉3枚を散布した場合は前回から約10日後の散布を目安とする。 ② 薬剤を新梢や花穂だけでなく、主幹や主枝にも丁寧に散布する。(カイガラムシ対策)		

参考：ぶどう葉面散布資材(グリーンデイズ・オルガミン・ビックマグ)

- ◆ 使用時期目安：展葉6枚目～落花直後、袋掛け後（展着剤を加用する時期と同じ）  
※落花10日の防除～袋掛け前の防除まではブルーム溶脱の恐れがあるため混用しない。
- ◆ 農薬混用：可
- ◆ 近年の市内土壌分析結果から『マンガン不足』の園地が非常に多く確認されました。『グリーンデイズ』は不足気味のマンガン・ホウ素を補給でき、さらに苦土による葉色向上が期待できます。

資材名	倍率	成分・使用目的	規格
☆おすすめ グリーンデイズ	1,000	苦土・マンガン・ホウ素等の補給 葉色向上・ゴマ塩果対策・花ぶるい防止 等	1 kg
☆おすすめ オルガミン	1,000	苦土・マンガン・ホウ素・カリ等の補給 葉の厚み・受光体制向上・食味向上 等	1L・5L・10L・20L
ビックマグ	1,000	苦土補給 葉色向上	1 kg

★葉面散布は、微量要素の補給で葉や樹を健康にし、環境変化等に強い樹相を作る手助けをします

特報#5：5/16付け発行予定。定期散布等記載予定