



ぶどう特報 #10



2025 年 8 月 1 日
JA 中野市ぶどう部会
JA 中野市園芸課

7/14 の週からナガノパープル・巨峰の飛び玉が確認されました。

生育が早まっているので早生種（ナガノパープル等）はテルスター水和剤やイカズチ WDG の収穫前日数に注意してください。（テルスター水和剤：収穫 14 日前）（イカズチWDG：収穫 21 日前）

【8 月下旬の定期散布 ＊共通】

散布時期	前回から 10 日後	散布日：8 月 日 散布量： ℓ
散布薬剤	水 100 ℓ	
	展着剤（アピオン-E） 50 ml	
	IC ボルドー66D 2.5 kg（一・一）	
散布量	400 ℓ / 10a	
適用病害虫	べと病、晩腐病、黒とう病、さび病	
注意事項	① 【ボルドー代替】IC ボルドー66D に代えて、ムッシュボルドーDF500 倍又はコサイド 3000 の 2,000 倍又は園芸ボルドー500 倍を使用してもよい。<u>ただし、ムッシュボルドーやコサイド 3000 や園芸ボルドーを使用する場合は、高温時や降雨後の散布で薬害を生じる恐れがあるため、クレフノン 100 倍を加用する。</u> ② 収穫中のナガノパープル等に飛散しないように注意する。	

【9 月上旬の特別散布 ＊共通】

散布時期	前回から 10 日後	散布日：9 月 日 散布量：_____ ℓ
散布薬剤	水	
	展着剤（アピオン-E）	50 ml
	IC ボルドー-66D	2.5 kg（一・一）
散布量	400 ℓ / 10a	
適用病害虫	べと病、晩腐病、黒とう病、さび病	
注意事項	① 【ボルドー代替】IC ボルドー-66D に代えて、ムッシュボルドーDF500 倍又はコサイド 3000 の 2,000 倍又は園芸ボルドー500 倍を使用してもよい。 <u>ただし、ムッシュボルドーやコサイド 3000 や園芸ボルドーを使用する場合は、高温時や降雨後の散布で薬害を生じる恐れがあるため、クレフノン 100 倍を加用する。</u> ② 収穫中のナガノパープル・巨峰等に飛散しないように注意する。	

今年のぶどう特報の発行は今回で終了します。ぶどう情報 8 月 #1 も併せてお読みください。