



ぶどう特報 #4



2025 年 5 月 1 日
JA 中野市ぶどう部会
JA 中野市園芸課

露地の発芽は巨峰が 4/24、シャイン 4/26 に発芽をしました。（平年並）近年、展葉期前半は進度が不安定な傾向ですので、主要病害の初期密度抑制のため、生育ステージを確認して適期散布に努めてください。

年度	巨峰発芽	シャイン発芽	巨峰開花	シャイン開花	特記
平年	4/24	4/27	6/4	6/11	過去 10 年平均値
2024 (R6)	4/22	4/23	6/2	6/7	平年比 3～5 日早い。夏日観測により発芽期が早まった。
2025 (R7)	4/24	4/26	6/4 頃	6/11 頃	品種間差はほぼなし 発芽の南北差 2～3 日位の見込み

【5 月中旬 第 4 回 定期散布 *対象：シャインマスカット・クイーンルージュ®等】

散布時期	展葉 6 枚目頃 <u>*生育状況を確認して散布</u> （巨峰他は 3 日程度早い） シャインマスカット他散布目安 5/17～5/22 頃		
散布薬剤	水	100 ℓ	散布日：__月__日 散布量：_____ℓ
	展着剤（ハイテンパワー）	10 ml	
	オーソサイド水和剤 80	125 g（30 日前、3 回）	
	※グリーンデイズ 等	100 g（※葉面散布剤 詳しくは下記を参考）	
散布量	300 ℓ／10a		
適用病害虫	べと病、灰色かび病、晩腐病、黒とう病		
注意事項	① 今回の防除から 10 日間隔の散布を目安とする。		

参考：ぶどう葉面散布資材(グリーンデイズ・オルガミン・リーフマグ)

- ◆ 使用時期目安：展葉 6 枚目頃～落花直後、袋掛け後（展着剤を加用する時期と同じ）
※落花 10 日の防除～袋掛け前の防除まではブルーム溶脱の恐れがあるため混用しない。
- ◆ 農薬混用：可
- ◆ 近年の市内土壌分析結果から『マンガン不足』の園地が非常に多く確認されました。『グリーンデイズ』は不足気味のマンガン・ホウ素を補給でき、さらに苦土による葉色向上が期待できます。

資材名	倍率	成分・使用目的	規格
☆おすすめ グリーンデイズ	1,000	苦土・マンガン・ホウ素等の補給 葉色向上・ゴマ塩果対策・花ぶるい防止 等	1 kg
☆おすすめ オルガミン	1,000	苦土・マンガン・ホウ素・カリ等の補給 葉の厚み・受光体制向上・食味向上 等	1L・5L・10L・20L
リーフマグ	1,000	苦土補給 葉色向上	1 kg

★葉面散布は、微量要素の補給で葉や樹を健康にし、環境変化等に強い樹相を作る手助けをします

次回特報（予定） 5/16 頃 展葉 9 枚目の定期散布