



ぶどう特報 #7



2025年6月16日
JA中野市ぶどう部会
JA中野市園芸課

6/10に梅雨入りし、雨の降る日が多くなると思われます。梅雨時期は主要病害が発生しやすい時期なので天気予報をよく確認し、概ね10日間隔の防除に努めて下さい。

年度	巨峰開花	巨峰満開	シャイン開花	シャイン満開	特記
平年	6/4	6/8	6/11	6/15	過去10年平均値(H27~R6)
2024年(R6)	6/2	6/6	6/6	6/10	平年より早い生育
2025年(R7)	6/9	6/12頃	6/13頃	6/17頃	巨峰：開花昨年比+7日 シャイン：開花昨年比+7日

【満開10日後フラスター散布 *シャインマスカット・ピオーネ・ナガノパープルのみ】

散布時期	満開10日~満開20日後	品種名：_____
散布薬剤	水 100ℓ	散布日：__月__日
	フラスター液剤 200ml (60日前・2回)	散布量：_____ℓ
散布量	150ℓ/10a	
注意事項	①登録品種：シャインマスカット・ピオーネ・ナガノパープルのみ（ナガノパープルは、収穫前日数（60日前）に注意する。 ②弱樹勢や、若木等は新梢伸長が弱る恐れがある為、散布を控える。 ③シャインマスカット・ピオーネは1,000倍/300ℓで散布する。	

【7月上旬の定期散布 *共通】前回から10日後

散布時期	落花20日後	品種名：_____
散布薬剤	水 100ℓ	散布日：__月__日
	レーバスフロアブル 50ml (7日前・3回)	散布量：_____ℓ
	アミスター10フロアブル 100ml (30日前・3回)	品種名：_____
	ディアナWDG 10g (前日・2回)	散布日：__月__日
散布量	400ℓ/10a	散布量：_____ℓ
適用病害虫	べと病、灰色かび病、晚腐病、褐斑病、黒とう病、アザミウマ類、クビアカスカシバ	

※ 梅雨時期は10日間隔の防除を徹底し、散布死角のないように丁寧に散布する。

8月上旬に露地栽培日誌の配布があるまでは、ぶどう特報などに散布日・散布量を記録し、保管してください。

次回特報（予定）7/1頃 前回から10日後（落花30日後）の定期散布