



ぶどう特報 #9



2025 年 7 月 16 日
JA 中野市ぶどう部会
JA 中野市園芸課

粒肥大が急激に進んでいます。暑い日が続くので熱中症にならないよう、こまめに水分・塩分補給や休憩を取りながら摘粒・袋掛け等の作業を進めましょう。

【8 月上旬の定期散布 * 共通】

散布時期	前回から 10 日後	品種名：_____ 散布日：____ 月 ____ 日 散布量：_____ ℓ
散布薬剤	水 100 ℓ 展着剤（アビオン-E） 50 ml I C ボルドー-66D 2.5 kg（-・-） テルスター水和剤 100 g（14 日前・1 回）	品種名：_____ 散布日：____ 月 ____ 日 散布量：_____ ℓ 品種名：_____ 散布日：____ 月 ____ 日 散布量：_____ ℓ
散布量	400 ℓ / 10a	
適用病害虫	べと病、晩腐病、黒とう病、さび病、チャノキイロアザミウマ	
注意事項	① 【コガネムシ類対策】テルスター水和剤に代えて、劇イカズチ WDG1,500 倍（21 日前・5 回）を使用してもよい。 ② 早生種（ナガノパープル等）は、テルスター水和剤・イカズチ WDG の収穫前規制に注意する。	

【8 月中旬の定期散布 * 共通】

散布時期	前回から 10 日後	品種名：_____ 散布日：____ 8 月 ____ 日 散布量：_____ ℓ
散布薬剤	水 100 ℓ 展着剤（アビオン-E） 50 ml IC ボルドー-66D 2.5 kg（-・-）	品種名：_____ 散布日：____ 8 月 ____ 日 散布量：_____ ℓ
散布量	400 ℓ / 10a	品種名：_____ 散布日：____ 8 月 ____ 日 散布量：_____ ℓ
適用病害虫	べと病、晩腐病、黒とう病、さび病	
注意事項	① 【ボルドー液代替】IC ボルドー-66D に代えて、ムッシュボルドー-DF の 500 倍又はコサイド 3000 の 2,000 倍又は園芸ボルドーの 500 倍を使用してもよい。ただし、変更する場合は、高温時や降雨後の散布で薬害を生じる恐れがあるため、クレフノン 100 倍を加用する。	

8 月上旬に露地栽培日誌の配布があるまでは、ぶどう特報などに散布日・散布量を記録し、保管してください

次回特報（予定）8/14 頃 8 月下旬（前回から 10 日後）の定期散布
8/1 頃 露地栽培日誌発行予定