



ぶどう特報

#1



2026年3月30日
JA 中野市ぶどう部会
JA 中野市園芸課

気温も上がり農作業を開始する時期となってきました。長野市の桜開花予想(3/26 日本気象協会発表)が3/30頃と平年より10日ほど早い予想です。管内でも10日ほど生育が早まると予想されます。

また、カイガラムシの発生が目立っています。枝の背面や粗皮の内側などの散布死角となる場所にいるので薬剤散布の前に粗皮はぎを行い、初期密度の低減を図りましょう。

年度	巨峰発芽	シャイン発芽	特記
平年	4/24	4/27	過去10年平均値(H28~R7)
2025年(R7)	4/24	4/26	3~4月の低温により平年並みの生育
2026年(R8)	4/14頃	4/17頃	平年より10日ほど早い見込み

【特別散布(共通)】 カイガラムシ対策

散布時期	粗皮はぎ後(発芽前) 4月上旬頃	散布日: 4月 日
散布薬剤	水 100ℓ 展着剤(ハイテンパワー) 10ml トクチオン水和剤 125g(収穫45日前・3回)	散布量: ℓ
散布量	300ℓ/10a	
適用病害虫	コナカイガラムシ類、アザミウマ類	
注意事項	<p>① 【注意】訪花昆虫保護のため、早朝の散布を厳守する。</p> <p>② クイーンルーージュ®晩腐病対策: ベンレート水和剤200倍(休眠期・1回)を加用する。</p>	

粗皮はぎポイント

目的: カイガラムシ・クビアカスカシバ等の主幹害虫対策・初期密度の低減

時期: 藁外し終了後(4月上旬頃)

ポイント

- 休眠期防除前に必ず粗皮はぎを行い、薬剤が直接かかるようにする
- 藁外し → 粗皮はぎ → 休眠期防除 の順番で作業を進める

裏面もご確認ください

【第1回 定期散布】 *対象：巨峰・ナガノパープル等

散布時期	発芽直前 *4月上中旬頃	散布日：4月 日
散布薬剤	水 100ℓ 展着剤（ハイテンパワー） 10 ml パスポート顆粒水和剤 400g（休眠期・1回）	散布量： ℓ
散布量	300ℓ / 10a	
適用病害虫	黒とう病・晩腐病	
注意事項	① 晩腐病密度抑制のため、発芽前に散布完了する。	

【第1回 定期散布】 *対象：シャインマスカット・クイーンルージュ®等

散布時期	発芽直前 *4月中旬頃	散布日：4月 日
散布薬剤	水 100ℓ 展着剤（ハイテンパワー） 10 ml 劇デランフロアブル 500 ml（休眠期・1回）	散布量： ℓ
散布量	300ℓ / 10a	
適用病害虫	黒とう病・晩腐病	
注意事項	【注意】劇デランフロアブルは葉焼けなどの薬害が発生するため、発芽前に散布完了する。	

黒とう病・晩腐病対策

- 巻きひげや収穫痕、昨年の発病痕の除去
- 芽かき・新梢管理の徹底（薬液・空気の通りをよくする）
- 満開期以降の散布間隔に注意する（概ね10日間隔で散布する）
- 袋かけ前の防除後、早期に袋かけを行う

次回特報（予定）：4月16日頃 カイガラムシ類特散・発芽直後・展葉3枚目の定期散布