

ぶどう特報

#2



2025年4月16日
JA 中野市ぶどう部会
JA 中野市園芸課

長野市の桜は3/31(平年より11日早い)に開花し、営農センター前の桜は4/3に開花しました。昨年より1週間程度早く生育推移の予想となっております。春先の気温上昇は急速に生育が進む場合がありますので生育状況を良く確認し、防除散布遅れのないように計画的に進めてください。

| 年度 | 巨峰発芽 | シャイン発芽 | 巨峰開花 | シャイン開花 | 特記 |
|-----------|-------|--------|-------|--------|-----------------------------------|
| 平年 | 4/24 | 4/27 | 6/5 | 6/11 | 過去10年平均値(H28~R7) |
| 2025 (R7) | 4/23 | 4/26 | 6/3 | 6/6 | 平年比-3~5日 夏日観測により開花が急激に進み発芽期が早まった。 |
| 2026 (R8) | 4/17頃 | 4/20頃 | 5/28頃 | 6/1頃 | 平年より1週間早く推移の予想 |

【特別散布(共通) 樹幹塗布 コナカイガラムシ類対策】



| | | | |
|-------|--|--------------------------------|-------------------------|
| 散布時期 | 5月初旬 | | |
| 散布薬剤 | 水 20 ml アルバリン顆粒水溶剤 20 g (幼果期まで・1回) ※水:アルバリン = 1:1 で調合 | 散布日: ___ 月 ___ 日 散布量: ___ l | |
| 散布量 | 1樹あたり20~40g *目安:直径10cm以上の樹で薬液20g、直径20cm以上の樹で薬液40g | | |
| 適用病害虫 | コナカイガラムシ類・クビアカスカシバ | | |
| 注意事項 | <ol style="list-style-type: none"> 主幹分岐部下30~50cm程度粗皮削りし塗布する。 ガットサイドS(原液~1.5倍液)を塗布した場合はアルバリン顆粒水溶剤を右図の位置に塗布する。 *注意:重ね塗りしない・混用して塗り付けない ハケを立てて泡を立てるように塗る。 *毛先を寝かせて塗ると薬液が流れやすい。 晴天日が塗布後に数日続く日をねらって実施する。 *流亡防止 | | <p>アルバリンとガットサイド併用方法</p> |

【第2回 定期散布】 *対象:シャインマスカット・クイーンルージュ®等

| | | | |
|-------|--|--------------------------------|--|
| 散布時期 | 発芽直後(4月下旬頃) 散布目安 4/18~4/22頃 *生育状況を確認して散布 | | |
| 散布薬剤 | 水 100 l 展着剤(ハイテンパワー) 10 ml 劇)モスピラン顆粒水溶剤 50 g (14日前・3回) | 散布日: ___ 月 ___ 日 散布量: ___ l | |
| 散布量 | 300 l / 10a | | |
| 適用病害虫 | ツマグロアオカスミカメ・カイガラムシ類 | | |
| 注意事項 | <ol style="list-style-type: none"> 訪花昆虫保護のため、早朝の散布を厳守する。 モスピラン顆粒水溶剤に代えてスミチオン水和剤40を1,000倍で使用しても良い。尚、スミチオン水和剤40も散布する場合は、訪花昆虫保護のため早朝散布を厳守する。 散布適期:園内の3割程度が右写真の状態に到達した頃 | | |

裏面もご確認ください

【第3回 定期散布】 *対象：シャインマスカット・クイーンルージュ®等

| | | | |
|-------|---|-----------------|-----------------------|
| 散布時期 | 展葉3枚目頃 <u>*生育状況を確認して散布</u> シャインマスカット他散布目安：4/28～5/3頃 | | |
| 散布薬剤 | 水 | 100ℓ | 散布日：__月__日 散布量：__ℓ |
| | 展着剤（ハイテンパワー） | 10 ml | |
| | トレノックスフロアブル | 100 ml（60日前・2回） | |
| | 劇ダイアジノン水和剤 34 | 100 g（30日前・2回） | |
| 散布量 | 300ℓ / 10a | | |
| 適用病害虫 | 黒とう病、べと病・晩腐病 クワコナカイガラムシ若齢幼虫 | | |
| 注意事項 | 散布適期：園内の3割程度が下写真の状態に到達した頃 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> | | |

【黒系特別散布】 *対象：巨峰等

| | | | |
|-------|---|-----------------|-----------------------|
| 散布時期 | 展葉3枚目頃 <u>*生育状況を確認して散布</u> 巨峰散布目安：4/25～4/30頃 | | |
| 散布薬剤 | 水 | 100ℓ | 散布日：__月__日 散布量：__ℓ |
| | 展着剤（ハイテンパワー） | 10 ml | |
| | トレノックスフロアブル | 100 ml（30日前・2回） | |
| 散布量 | 300ℓ / 10a | | |
| 適用病害虫 | べと病、晩腐病、黒とう病 | | |
| 注意事項 | 黒系ぶどうで、べと病が心配される園地では特別散布を行う | | |

※ 栽培日誌の配布があるまでは、ぶどう特報に散布日・散布量を記録し、保管するようにお願いします。
露地の栽培日誌は8月上旬配布予定です。

次回特報（予定）：4月30日頃 展葉6枚目の定期散