



ぶどう特報 #5



2026年6月1日
JA 中野市ぶどう部会
JA 中野市園芸課

4月下旬～5月上旬の夜温が低かったため生育が停滞しておりましたが、5月中旬の高温で生育停滞を巻き返してきております。露地の開花は昨年比で1週間程度早い見込みです。

梅雨期間は黒とう病・晩腐病等の主要病害感染拡大が懸念されます。概ね10日間隔で防除を進めてください。また、誘引作業を進め、薬液の通りのよい環境づくりに努めましょう。

年度	巨峰開花	巨峰満開	シャイン開花	シャイン満開	特記
平年	6/5	6/9	6/11	6/15	過去10年平均値(H27～R7)
2025年(R7)	6/9	6/13	6/13	6/16	平年並みの生育
2026年(R8)	6/1頃	6/5頃	6/5頃	6/9頃	昨年より1週間程度早い見込み

【強樹勢特別散布】

対象：シャインマスカット・ピオーネ・ナガノパープルのみ

散布時期	満開 10日～満開 20日後	品種名： _____ 散布日： ____月 ____日 散布量： _____ℓ
散布薬剤	水 100ℓ フラスター液剤 200ml (60日前・2回)	品種名： _____ 散布日： ____月 ____日 散布量： _____ℓ
散布量	150ℓ/10a	
注意事項	①登録品種：シャインマスカット・ピオーネ・ナガノパープルのみ ※ナガノパープルは、収穫前日数(60日前)に注意する。 ②弱樹勢や、若木等は新梢伸長が弱る恐れがある為、散布を控える。	

【6月下旬の定期散布】 対象：共通

散布時期	落花 10日後	品種名： _____ 散布日： 6月 ____日 散布量： _____ℓ
散布薬剤	水 100ℓ フェニックスフロアブル 25ml (14日前・2回) トランスフォームフロアブル 50ml (3日前・3回) ジマンダイセン水和剤 100g (45日前・2回)	品種名： _____ 散布日： ____月 ____日 散布量： _____ℓ
散布量	400ℓ/10a	
適用病害虫	べと病、晩腐病、黒とう病、褐斑病、スカシバ類、カイガラムシ類、アザミウマ類	
注意事項	①ジマンダイセン水和剤等のマンゼブ成分を含む農薬は、年間使用回数を2回までとする。 ②農薬汚れ対策として雨よけではジマンダイセン水和剤に代えて、 ホライズンドライフロアブルを2500倍(21日前、3回)で使用しても良い。	

※ 梅雨時期は10日間隔の防除を意識、徹底し散布死角のないように丁寧に散布する。

8月上旬に露地栽培日誌の配布があるまでは、ぶどう特報などに散布日・散布量を記録し、保管してください。

次回特報 6/17 落花 20日後の防除の定期散布。