



ぶどう特報 #6



2026年6月16日
JA 中野市ぶどう部会
JA 中野市園芸課

6/7に梅雨入りが宣言されました。

梅雨期間はべと病・黒とう病・晩腐病等の主要病害感染拡大が懸念されます。概ね10日間隔で防除を進めてください。薬液の通りのよい環境づくりに努めましょう。

年度	巨峰開花	巨峰満開	シャイン開花	シャイン満開	特記
平年	6/5	6/9	6/11	6/15	過去10年平均値(H27~R7)
2025年(R7)	6/9	6/13	6/13	6/16	平年並みの生育
2026年(R8)	6/1	6/3	6/5	6/8	昨年よりジベ処理適期が1週間以上早い見込み

【6月下旬～7月初旬の定期散布】 対象：共通

散布時期	落花20日後	品種名：_____
散布薬剤	水	100ℓ
	レーバスフロアブル	50ml (7日前・3回)
	アミスター10フロアブル	100ml (30日前・3回)
	ディアナWDG	10g (前日・2回)
散布量	400ℓ/10a	散布日：6月____日
適用病害虫	べと病、灰色かび病、晩腐病、黒とう病、褐斑病、クビアカスカシバ、アザミウマ類	散布量：_____ℓ
注意事項	①黒とう病発生園は病斑切除後、カナメフロアブル4000倍(前日・3回)を加用する。	

【7月上旬の定期散布】 対象：シャイン、ルージュ（黒系ぶどうは特別散布）

散布時期	落花30日後	品種名：_____
散布薬剤	水	100ℓ
	ライメイフロアブル	25ml (14日前・3回)
	オンリーワンフロアブル	50ml (前日・3回)
	アディオフロアブル	50ml (7日前・5回)
散布量	400ℓ/10a	散布日：6月____日
適用病害虫	べと病、灰色かび病、晩腐病、黒とう病、褐斑病、チャノキイロアザミウマ、コガネムシ類	散布量：_____ℓ
注意事項	①袋かけ直前の散布とする。 ②晩腐病・黒とう病対策でオンリーワンフロアブルに代えてミギワ20フロアブル2000倍(前日・3回)を使用してもよい。 ③散布後なるべく早く袋かけを行う。	

※ 梅雨時期は10日間隔の防除を意識、徹底し散布死角のないように丁寧に散布する。

次回特報 7/1 袋掛け直後の防除の定期散布。