



ぶどう特報 #7



2026年7月1日
JA 中野市ぶどう部会
JA 中野市園芸課

ぶどう作業も大詰め目前を迎え、ボルドーの散布時期となってまいりました。
ボルドーは特に汚れが目立つ為、近接園地で他品目がある場合はドリフトを注意すると共に、通勤通学時間の散布は十分に注意して散布しましょう。

【7月中旬の定期散布】 対象：共通

散布時期	袋かけ直後		品種名： _____
散布薬剤	水	100 ℓ	散布日： 7月 _____ 日
	展着剤（アビオン-E）	50 ml	散布量： _____ ℓ
	アルバリン顆粒水溶剤	50 g（前日・3回）	
	園芸ボルドー	200 g（-）	
散布量	400 ℓ / 10a		
適用病害虫	さび病、(ベと病)、チャノキイロアザミウマ、ブドウトラカミキリ、カメムシ類、コナカイガラムシ類		
注意事項	①ハダニ類対策：コロマイト水和剤 2,000 倍（7 日前、2 回）を加用する。 ②クビアカスカシバ対策：パダン SG 水溶剤 1,500 倍（14 日前、2 回）を加用する。 ③園芸ボルドーを使用する場合は、高温時や降雨後の散布で薬害が生じる恐れがあるため、クレフノン 100 倍を加用する。		

【7月下旬の定期散布】 対象：共通

散布時期	前回から 10 日後		品種名： _____
散布薬剤	水	100 ℓ	散布日： 7月 _____ 日
	展着剤（アビオン-E）	50 ml	散布量： _____ ℓ
	IC ボルドー	2.5 kg（-）	
	テルスター水和剤	100 g（14 日前・1 回）	
散布量	400 ℓ / 10a		
適用病害虫	ベと病、(晩腐病、黒とう病、さび病)、チャノキイロアザミウマ、		
注意事項	コガネムシ類対策 テルスター水和剤に代えて、イカズチ WDG の 1,500 倍（21 日前、5 回）を使用する。 ※早生種は収穫前規制に注意する。		

※10 日間隔の防除を意識、徹底し散布死角のないように丁寧に散布する。

次回特報 7/16 8月上旬 IC ボルドーの定期散布。