



ぶどう特報



2026 年 7 月 16 日
JA 中野市ぶどう部会
JA 中野市園芸課

#8

ぶどう作業も大詰めを迎え、ボルドーの散布時期となってまいりました。

現在、一部の園地ではダニの発生が確認されています。園地をよく観察し、発生が見られる場合は防除を実施してください。

ボルドーは特に汚れが目立つ為、近接園地で他品目がある場合はドリフトを注意すると共に、通勤通学時間の散布は十分に注意して散布しましょう。

【8 月上旬の定期散布】 対象：共通

散布時期	前回から 10 日後		品種名：_____
散布薬剤	水	100 ℓ	散布日：8 月 _____ 日
	展着剤（アビオン-E）	50 ml	散布量：_____ ℓ
	IC ボルドー 66D	2.5 kg	
散布量	400 ℓ / 10a		
適用病害虫	べと病、(晩腐病、黒とう病、さび病)		
注意事項	IC ボルドー66D 代替 ムッシュボルドーDF の 500 倍又はクミガード SC の 1,000 倍又は園芸ボルドーの 500 倍を使用してもよい。 ただし、変更する場合は高温時や降雨後の散布で薬害が生じる恐れがあるため、クレフノン 100 倍を加用する。		

・ハダニ防除について

ダニの発生が確認できる場合はコロマイト水和剤を 2,000 倍（7日前、2 回）で加用する。ただし、袋かけ前にカネマイトフロアブルを散布した方は、ダニの発生状況を確認して検討する。

【8 月中旬の定期散布】 対象：共通

散布時期	前回から 10 日後		品種名：_____
散布薬剤	水	100 ℓ	散布日：8 月 _____ 日
	展着剤（アビオン-E）	50 ml	散布量：_____ ℓ
	IC ボルドー 66D	2.5 kg	
散布量	400 ℓ / 10a		
適用病害虫	べと病、(晩腐病、黒とう病、さび病)		
注意事項	IC ボルドー66D 代替 ムッシュボルドーDF の 500 倍又はクミガード SC の 1,000 倍又は園芸ボルドーの 500 倍を使用してもよい。 ただし、変更する場合は高温時や降雨後の散布で薬害が生じる恐れがあるため、クレフノン 100 倍を加用する。		

次回特報 8/3 収穫後 IC ボルドーの定期散布。