



ぶどう特報 #10



2023 年 8 月 1 日
JA 中野市園芸課
JA 中野市ぶどう部会

- ◆ 早場地帯で 7/25 前後にシャインの水まわり確認。飛び玉・水回り概ね平年並み。
- ◆ ベレーゾン後の枝管理等：水まわり確認後、房まわりの副梢整理（葉 1 枚残し等）や生育が旺盛な新梢の摘芯等を実施し、園地内に適度な明るさを確保してください。
- ◆ 露地収穫解禁予定：ナガノパープル・巨峰 8/27、種なし巨峰 9/3、シャインマスカット 9/13、クイーンルージュ®9/24 * 概ねの解禁予定です。気象条件等で前後する場合があります。
- ◆ 梅雨明け後の高温が予想されています。保水対策として幹まわり中心に敷きワラの実施や、4～5 日間を目安に長期間降雨のない場合は、ほ場の水分状態・土壌条件にあわせてかん水を行う等の対策をお願いします。

【8 月下旬の定期散布 * 共通】

散布時期	前回から 10 日後	散布日：8 月 日
散布薬剤	水 100ℓ 展着剤（アビオン-E） 50 mℓ IC ボルドー66D 2.5 kg（-・-）	散布量： リットル
散布量	400ℓ／10a	
適用病害虫	晩腐病、さび病、べと病、黒とう病	
注意事項	① 【ボルドー代替】IC ボルドー66D に代えて、ムッシュボルドーDF500 倍、コサイド 3000 の 2,000 倍、4-4 式ボルドーのいずれかを使用してもよい。 <u>ただし、ムッシュボルドーやコサイド 3000 を使用する場合は、高温時や降雨後の散布で薬害を生じる恐れがあるため、クレフノン 100 倍を加用する。</u> ② 収穫中のナガノパープル等には飛散しないように注意する。	

【9 月上旬の特別散布 * 共通】

散布時期	前回から 10 日後	散布日：9 月 日
散布薬剤	水 100ℓ 展着剤（アビオン-E） 50 mℓ IC ボルドー66D 2.5 kg（-・-）	散布量： リットル
散布量	400ℓ／10a	
適用病害虫	晩腐病、さび病、べと病、黒とう病	
注意事項	① 【ボルドー代替】IC ボルドー66D に代えて、ムッシュボルドーDF500 倍、コサイド 3000 の 2,000 倍、4-4 式ボルドーのいずれかを使用してもよい。 <u>ただし、ムッシュボルドーやコサイド 3000 を使用する場合は、高温時や降雨後の散布で薬害を生じる恐れがあるため、クレフノン 100 倍を加用する。</u> ② 収穫中のナガノパープル・巨峰等には飛散しないように注意する。	

本年のぶどう特報の発行は今回で終了します。ぶどう情報 8 月 #1 も併せてお読みください。