

もも・ネクタリン特報 No. **11**

2022. 9. 1

J A 中野市営農センター

J A 中野市りんご・もも部会

※もも極晩生種（ゴールドデンピーチ、西王母、等）**特別防除**

※有袋栽培で除袋が間近な場合は、除袋後に散布する。

※農薬散布時の注意事項

①隣接園・今後収穫期を迎える作物に飛散しないよう十分注意する。

②散布後は、タンク内や散布器具の洗浄を十分に行い、薬液が残らないよう注意する。

もも

特別散布

散布時期	9月上旬～中旬	散布日目安：9月5日～14日	散布日	月	日
散布薬剤	水 100ℓ当り	展着剤（ハイテンパワー） 10ml	散布量		ℓ
		オンリーワンフロアブル 50ml	（収穫前日まで、3回以内）		
散布量	10アール当り 500ℓ				
混用順	水 ⇒ 展着剤 ⇒ オンリーワンF				
対象病害虫	灰星病、黒星病、ホモプシス腐敗病				
注意事項	※オンリーワンフロアブルに代えて、オーシャインフロアブルの2,000倍（前日、3回）でもよい。 ※シンクイムシ類・アザミウマ類対策： 劇 イカズチWDGの1,500倍（前日、5回）を加用する。				

●今後、収穫を迎える品種で灰星病の発生が見られる場合は、殺菌剤の特別散布を実施して下さい。

	薬剤の系統	薬剤名	使用濃度	適正使用基準	使用上の注意事項
もも	エルゴステロール 生合成阻害剤（DMI）	スコア顆粒水和剤	2000倍	収穫前日まで（3回）	1. ベルクートは、バラ・メロンに薬害を生じるのでかからないようにする。 2. ダコニール1000は、除袋直後に散布すると薬害が発生する場合がありますので注意する。
		オーシャインフロアブル	2000倍	収穫前日まで（3回）	
オンリーワンフロアブル		2000倍	収穫前日まで（3回）		
その他	ベルコートフロアブル	2000倍	収穫前日まで（3回）		
	ダコニール1000	1000倍	収穫前日まで（6回）		
ネクタリン	エルゴステロール 生合成阻害剤（DMI）	スコア顆粒水和剤	2000倍	収穫前日まで（2回）	
		オーシャインフロアブル	2000倍	収穫前日まで（3回）	
		オンリーワンフロアブル	2000倍	収穫前日まで（3回）	
その他	ダコニール1000	1000倍	収穫前日まで（2回）		

「晩生種～極晩生種」収穫開始予想

直前の気象条件により前後しますが、下表を参考に、果実の状況を見て収穫適期を判断して下さい。

川中島白桃・黄金桃の経過を見ると、8月上中旬の気象によりやや果肉先行の果実が散見されます。そのため、晩生種以降の品種の収穫は、昨年・平年並み～1・2日程遅く設定しております。

*収穫前に必ず食味・糖度チェックをし収穫を進めて下さい。

品 種	南部地区	平岡地区
幸茜	9 / 3	9 / 5
さくら白桃	9 / 8	9 / 10
黄貴妃（無着色）	9 / 3	9 / 5
選抜白根白桃（岩戸系）	9 / 8	9 / 10
在来系白根白桃	9 / 11	9 / 13
ゴールドデンピーチ	9 / 15	9 / 18
秀峰（ネクタリン）	9 / 4	9 / 7

次面には、秋期講習会について記載しています。

令和4年9月1日

部会員 各位

J A中野市りんご・もも部会
J A中野市園芸課

もも・ネクタリン 秋季講習会の開催について

毎日のお仕事お疲れ様です。

標記の件につきまして、下記により講習会を開催しますので、皆様の出席をお願いします。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、出席の際はマスク着用をお願いいたします。

記

1. 期日・場所

期 日	時 間	集 合 場 所
9月8日(木) (新規栽培者、 若手、女性生産者)	11:00	南部共選所
9月8日(木) (一般)	14:00	



※現地講習を行います。平岡・高社地区の皆様もご参加ください。

2. 内 容 ①秋季せん定について

②秋季防除について（せん孔細菌病対策）

3. その他 不明な点は、園芸課へお問合せください。



本年の「せん孔細菌病」発生は中野市全体では、少発生。次年度の越冬菌は、9月以降の風雨を伴って感染します。菌密度の抑制のために、秋季ボルドー散布を徹底してください。
(詳細は、もも・ネクタリン特報 No.12 参照)

【連絡先・問合せ先】

J A中野市 営農センター
営農部 園芸課

TEL : 0269-23-3933



以上