

# ぶどう特報No.6



No.6 2020.6.2  
JA 中野市営農センター  
JA 中野市ぶどう部会

乾燥による生育不良・花振いが心配されます。若木を中心にかん水の実施をお願いします。

2020年	開花	満開	落花
昨年(巨峰)	6月5日	6月9日	6月12日
本年(巨峰)	6月7日?	6月10日?	6月13日?
本年(シャイン)	6月13日?	6月15日頃?	6月18日頃?

## 第8回【ぶどう定期防除】(晩腐病、黒とう病、スリップス類防除)

散布時期	前回から10日(落花直後)	南部: 6/13~ 北部: 6/15~ (巨峰)	
散布品種	全品種		
散布薬剤	水	100 l	散布日 <b>6月 日</b>
	●コテツフロアブル (60日前、2回)	50 ml	
	スイッチ顆粒水和剤 (30日前、2回)	33 g	
	ジマンダイセン水和剤 (45日前、2回)	100 g	
散布量	400l/10a		
注意点	① ジマンダイセン・ペンコゼブ・ゾーベックエニベルは同一成分が含まれるため総使用回数に注意する(合計2回まで) ② 例年クビアカスカシバが発生する園は(劇物)パダンSG水溶剤1,500倍(収穫21日前、5回)を加用する。(果粉溶脱の心配があるため小豆大頃までの散布とする。)		

### ☆房切り基準について☆

品 種	房切り目安	目標粒数	目標房重
種なし巨峰	満開時 3.0 cm	30粒程度	400 g
有核巨峰	満開時 7.0 cm	35粒程度	350 g
シャインマスカット	満開時 3.5 cm	25~35粒程度	550 g
ピオーネ	満開時 2.5 cm	25粒程度	400 g
ナガノパープル	満開時 3.0 cm	30粒程度	400 g
クイーンニーナ	満開時 3.0 cm	30粒程度	500 g
ロザリオビアンコ	満開時 7.0 cm	35粒程度	400 g
サニールージュ	満開時 6.0 cm	40粒程度	300 g

### ※重要※ 黒とう病に注意してください。

本年は黒とう病のリスクが高い年になります。以下の点に注意しながら作業を進めてください。

- ① 症状の確認 ⇒ 右写真参照
- ② 防除の実施 ⇒ 10日間隔の定期防除
- ③ 草刈りの実施 ⇒ 下草からの伝染があります
- ④ 昨年発生した場所の確認 ⇒ 昨年の病斑が伝染源
- ⑤ 被害枝葉の確認 ⇒ 被害枝葉を園地外へ持ち出す

症状の早期発見で被害の拡大を防げます。過去に発生があった園地は特に注意して確認をしてください。



白丸の部分が病斑です。  
 ・黒い淵  
 ・葉に穴  
 ・枝は凹凸が出る  
 ・雨で移る等の特性あり

**裏面には未開花症状対策特報あり**

次回特報は6月17日頃発行予定

# シャインマスカット未開花症状特別号

2020.6.2

JA 中野市営農センター

JA中野市ぶどう部会

例年発生していますシャインマスカットの未開花症状が今年も雨よけ・露地等で確認されました。房切り前に以下の点を必ず確認して房切りに取り掛かってください。

## 1. 未開花の症状について

- (1) 花冠（キャップ）のしわが無い或少ない。（正常な花蕾はピーマンのような形。）
- (2) 開花前になっても緑色が濃い。（正常な花蕾は開花期になると黄緑色に変色する）
- (3) 未開花症状の花蕾は正常なものに比べ緑色が濃く、丸い（扁平）。
- (4) 房先端の花蕾が房上部と比較して小さい。



未開花の粒

- 花冠のしわが少ない。
- 花蕾が扁平。（イチジク型？饅頭型？）
- 開花前も濃い緑色



正常な房の粒



- 花冠のしわが多い。ぼこぼこしている
- 花蕾が長細い（ピーマン型）
- 開花前は薄緑色。

未開花の有無は展葉 5 枚ごろから確認できます。

## 2. 対策について

※症状をよく確認した後、房切りを実施する※

- (1) 健全な部分（上部や中間部の支梗）を利用した房切りを実施する。
- (2) 房の先端を利用する場合は房切りを長めにする。



未開花が確認された場合・・・

- ①主穂中間部を使用する。
- ②ショルダーや支梗を使用する。