

- この特報は、7/14 発行の「もも・ネクタリン特報No.⑨」の薬剤散布（散布目安は、8/5～10 頃）が終わってから行なう防除を掲載しています。特報No.⑨の内容を再度、ご確認ください。
- 早生品種以降の生育は、概ね平年並みの進みとなって来ています。
収穫前には必ず食味チェックをし、収穫を進めてくださいますようお願いいたします。
- 有袋品種の除袋遅れには十分注意して下さい。（除袋目安：収穫 10～14 日前）

もも

第 1 2 回薬剤散布

散布時期	8 / 2 0 ～ 2 5 頃（目安となります）	◆ 散布日：8 月 日
散布薬剤	水 1 0 0 ℓ 当り 展着剤（ハイテンパワー） 1 0 ml <u>ベルコートフロアブル 5 0 ml （前日、3 回）</u> <u>アーデントフロアブル 5 0 ml （前日、3 回）</u>	◆ 散布量： リットル
対象病害虫	黒星病、灰星病、ホモブシス腐敗病 シンクイムシ類、カメムシ類、アザミウマ類	
散布量	1 0 アール当り：5 0 0 リットル	
注意事項	①有袋品種は除袋後に散布する。	

ネクタリン

第 1 2 回薬剤散布

散布時期	8 / 2 0 ～ 2 5 頃（目安となります）	◆ 散布日：8 月 日
散布薬剤	水 1 0 0 ℓ 当り 展着剤（ハイテンパワー） 1 0 ml <u>ベルコートフロアブル 5 0 ml （前日、2 回）</u>	◆ 散布量： リットル
対象病害虫	黒星病、灰星病、ホモブシス腐敗病	
散布量	1 0 アール当り：5 0 0 リットル	
注意事項	①【もも混植園】シンクイムシ類対策 アーデントフロアブル 2, 000 倍（前日、3 回）を加用する。	

次回特報配布

発行予定日：8 月 17 日

9 月上旬の特別散布について

散布日目安：9 月 5～10 日頃