



- ◆ 次面には西洋梨の定期防除について記載しています。
- ◆ 7 月下旬に夏季園地点検を実施致します。皆様の出席をお願い致します。
(7/3 発行の夏季園地点検開催通知をご確認下さい)

● 和梨（有袋）の定期防除（収穫前や収穫中の作物への飛散に十分注意して下さい。）

【有袋】7 月下旬の薬剤散布（前回より 15 日後）

散布時期	7 月 3 0 日前後 ※目安となります
散布薬剤	水 1 0 0 リットル 展着剤（ハイテンパワー） 1 0 ml コロマイト乳剤 1 0 0 ml（前日、1 回） ベルコートフロアブル 5 0 ml（14 日前、5 回） 劇イカズチWDG 6 6 g（前日、3 回）
対象病害虫	黒斑病、黒星病、シンクイムシ類、カメムシ類、ハダニ類
散布量	10 a 当り：450 リットル以上
注意事項	【代替】早生種等 ベルコートフロアブルに代えて、キノンドー顆粒水和剤 1,000 倍（3 日前、9 回）でもよい。

◆ 散布日：7 月 日

◆ 散布量： リットル

● 和梨（無袋）の定期防除（収穫前や収穫中の作物への飛散に十分注意して下さい。）

【無袋】7 月下旬の薬剤散布（前回より 10 日後）

散布時期	7 月 3 0 日前後 ※目安となります
散布薬剤	水 1 0 0 リットル 展着剤（ハイテンパワー） 1 0 ml 劇バリアード顆粒水和剤 5 0 g（前日、3 回）
対象病害虫	アブラムシ類、カメムシ類、シンクイムシ類
散布量	10 アール当り：450 リットル
注意事項	【代替】通常展着剤に代えて、ササラ 2,000 倍を使用すると薬液の広がりがよくなり、散布後の乾きも早くなる効果がある。

◆ 散布日：7 月 日

◆ 散布量： リットル

西洋梨（無袋）の定期防除

【無袋】7月下旬の薬剤散布（前回より15日後）

散布時期	7月30日前後 ※目安となります	◆ 散布日：7月 日
散布薬剤	水 100ℓ 展着剤（ハイテンパワー） 10ml キノンドー顆粒水和剤 100g （3日前、9回） (劇)イカズチWDG 66g （前日、3回）	◆ 散布量 ℓ
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、カメムシ類	
散布量	10a 当り：600ℓ	
注意事項	①【代替】キノンドー顆粒水和剤に代えて、ベルコートフロアブル2,000倍（14日前、5回）でもよい。なお、ベルコートフロアブルはル・レクチェに薬害を生じるので使用しない。 ② ハダニ類対策 コロマイト乳剤の1,000倍（前日、1回）を加用する。	

【農薬散布時の注意事項】

- ① 隣接園・今後収穫期を迎える作物に飛散しないよう十分注意する。
- ② 散布後は、タンク内や散布器具の洗浄を十分に行い、薬液が残らないよう注意する。

◆ 【7月中下旬の重点作業】

- ① 土壌水分管理（土壌水分の激変を緩和）

梅雨明け後の急激な土壌乾燥防止 ⇒ 樹冠下に敷きワラ等のマルチを早めに行ってください。

- ② 雑草管理：害虫の発生源となりますので、園内除草を徹底して下さい。

除草剤使用基準：バスタ液剤（水100ℓ 当たり バスタ液剤 500ml）収穫前日まで、3回以内
ザクサ液剤（水100ℓ 当たり ザクサ液剤 500ml）収穫前日まで、3回以内

次回特報

発行予定日：8月3日

【和梨】	有袋：8月中旬	※8/15前後
	無袋：8月上中旬	※8/10前後
【西洋梨】	有袋：8月中旬	※8/15前後
	無袋：8月中旬	※8/15前後