



ナシ特報 No.10

2023年8月2日
JA中野市営農センター
JA中野市ナシ部会

◆ 別紙にて和梨・西洋梨早生種の日揃会開催について配布しております。

● 和梨【有袋・無袋】の共通定期防除

散布時期	無袋：8月10日前後（前回から10日後） 有袋：8月15日前後（前回から15日後）	◆ 散布日：8月 日
散布薬剤	水 100ℓ 展着剤（ハイテンパワー） 10ml エクシレルSE 20ml（前日、3回） ナリアWDG 50g（前日、3回）	◆ 散布量： ℓ
対象病害虫	黒斑病、輪紋病、シンクイムシ類、ハマキムシ類、ケムシ類	
散布量	10a 当り：450 ℓ以上	
注意事項	①早生種（幸水等）最終散布。 ②ナリアWDGは、ピオーネ、サニールージュに薬害を生じる恐れがあるため飛散しないよう注意する。	

西洋梨【有袋】の定期防除

散布時期	8月15日前後 ※前回から20日後	◆ 散布日：8月 日
散布薬剤	水 100ℓ 展着剤（ハイテンパワー） 10ml キノンドー顆粒水和剤 100g（3日前、9回） 劇イカズチWDG 66g（前日、3回）	◆ 散布量： ℓ
対象病害虫	輪紋病、アブラムシ類、カメムシ類、シンクイムシ類	
散布量	10アール当り：600 ℓ	
注意事項	①早生種（オーロラ等）最終散布。 ②ハダニ類対策：コロマイト乳剤1,000倍（前日、1回）を加用する。 ③キノンドー顆粒水和剤に代えて、ベルコートフロアブル2,000倍（14日前、5回）でも良い。なお、ル・レクチェに薬害を生じるので使用しない。 また、収穫前規制には十分注意する。	

西洋梨（無袋）の定期防除

散布時期	8月15日前後 ※前回から15日後	◆ 散布日：8月 日
散布薬剤	水 100ℓ 展着剤（ハイテンパワー） 10ml キノンドー顆粒水和剤 100g（3日前、9回） 劇バリアード顆粒水和剤 50g（前日、3回）	◆ 散布量 ℓ
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、カメムシ類	
散布量	10a 当り：600 ℓ	

次回特報 発行予定日：8月17日
【和梨】：8月下旬
【西洋梨】：8月下旬～9月上旬