

- 本年は収穫開始から果肉軟化が早い傾向です。  
 収穫期を迎えた品種は、収穫遅れのないように日々園地確認お願い致します。
- スモヒメシンクイの発生が散見されます。第2世代が8月上旬頃に発生のピークを迎えると予想されます。  
 引き続き、10日間隔以内の薬剤散布を徹底し、被害果実は園外で処分して下さい。

1. プラム（2回分の防除を掲載）

【第14回 定期防除】 対象病虫害：灰星病（すす点病）ハダニ類 シンクイムシ類（ケムシ類）

|      |                                                                                 |                         |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| 散布時期 | ・8月10日～8月19日（第13回定期散布から10日後）                                                    |                         |  |
| 散布薬剤 | 水 100ℓ当り<br>展着剤（まくぴか） 20mℓ<br>パレード15フロアブル 50mℓ（前日、2回）<br>アーデントフロアブル 50mℓ（前日、3回） | 散布日<br>8月 日<br>散布量<br>ℓ |  |
| 散布量  | 10aあたり 500ℓ                                                                     |                         |  |
| 注意事項 | 【シンクイムシ多発園】劇テルスターフロアブルの3,000倍（前日、2回）を特別散布する。                                    |                         |  |

【第15回 定期防除】 対象病虫害：灰星病、シンクイムシ類、ケムシ類

|      |                                                                              |                         |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| 散布時期 | ・8月20日～8月29日（第14回定期散布から10日後）                                                 |                         |  |
| 散布薬剤 | 水 100ℓ当り<br>展着剤（まくぴか） 20mℓ<br>オンリーワンフロアブル 50mℓ（前日、3回）<br>エクシレルSE 40mℓ（前日、3回） | 散布日<br>8月 日<br>散布量<br>ℓ |  |
| 散布量  | 10aあたり 500ℓ                                                                  |                         |  |
| 注意事項 | 【シンクイムシ類対策】劇モスピラン顆粒水溶剤の2,000倍（前日、3回）を特別散布する。                                 |                         |  |

劇・・・劇物。ご購入の際は、印鑑をご持参ください。

次ページに、プルーン防除等を掲載しております

2. プルーン

【第 11 回 定期防除】 対象病害虫：灰星病、シンクイムシ類、ケムシ類

|      |                                                                                                                                                                                         |                         |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| 散布時期 | ・ 8 月 13 日～8 月 22 日 （第 10 回定期散布から10 日後）                                                                                                                                                 |                         |  |
| 散布薬剤 | 水 100ℓ 当り<br>オンリーワンフロアブル 50mℓ （前日、3回）<br>エクシレルSE 40mℓ （前日、3回）                                                                                                                           | 散布日<br>8月 日<br>散布量<br>ℓ |  |
| 散布量  | 10aあたり 500ℓ                                                                                                                                                                             |                         |  |
| 注意事項 | 【晩生種 灰星病・シンクイムシ類対策】<br>8 月下旬～9 月初旬に、オーシャインフロアブル 3,000 倍（前日、3回）と、  モスピラン顆粒水溶剤の 2,000 倍（前日、3回）を特別散布する。 |                         |  |

●スモヒメシンクイ フェロモントラップ調査について（7 / 26）調査：北信農業農村支援センター

| 年        | 一本木 |    | 上今井 |    | 倭  |    |
|----------|-----|----|-----|----|----|----|
| 2023年    | R5  | R4 | R5  | R4 | R5 | R4 |
| 5 月 31 日 | 23  | 14 | 0   | 3  | 9  | 21 |
| 6 月 7 日  | 15  | 11 | 0   | 7  | 3  | 0  |
| 6 月 14 日 | 12  | 3  | 0   | 1  | 5  | 1  |
| 6 月 21 日 | 17  | 13 | 0   | 2  | 7  | 3  |
| 6 月 28 日 | 33  | 50 | 1   | 6  | 37 | 36 |
| 7 月 5 日  | 46  | 35 | 4   | 8  | 43 | 80 |
| 7 月 12 日 | 52  | 29 | 1   | 9  | 38 | 66 |
| 7 月 19 日 | 38  | 18 | 1   | 6  | 27 | 47 |
| 7 月 26 日 | 30  | 8  | 3   | 5  | 19 | 20 |

＊第2世代の発生ピークは8月上旬頃と予想されます。  
＊防除間隔 10 日以内での薬剤散布を徹底して下さい。

【重要】

- ・隣接園（特に、今後収穫期を迎える作物）に飛散しないよう十分注意する。
- ・散布後は、タンク内や散布器具の洗浄を十分に行ない、薬液が残らないようにする。