

サクランボ特報

No. 4

令和6年5月16日
JA中野市営農センター
JA中野市サクランボ部会

生育は4月下旬の気温（平年比+4.3℃）により、平年より3日程進んでいます。生育の早い地域、品種により結実が判明してきました。結実状況を良く確認し、摘果を進めて下さい。また、次年度の花芽充実のため新梢管理を実施し、樹冠内の明るさを確保して下さい。収穫開始期は「香夏錦・高砂」が6月5日～10日頃、「佐藤錦」が6月10日～15日頃と予想されます。定期防除・管理作業は遅れないよう計画的に実施しましょう。

第5回 定期散布（高砂、佐藤錦等の最終防除）

灰星病、炭そ病、黒斑病、褐色せん孔病、オウトウショウジョウバエ、ハマキムシ類

散布時期	・5月29日～6月3日（第4回定期散布から14日後）
散布薬剤	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 【定期散布】散布日 ____月 ____日() 散布量_____ℓ </div>
	水 100ℓ当り オンリーワンフロアブル 50mℓ（前日、3回） ディアナWDG 10g（前日、2回）
散布量	500ℓ/10a

第6回 定期散布（紅秀峰、紅きらり等の最終防除）

灰星病、炭そ病、黒斑病、褐色せん孔病、オウトウショウジョウバエ

散布時期	・6月12日～6月17日（第5回定期散布から14日後）
散布薬剤	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 【定期散布】散布日 ____月 ____日() 散布量_____ℓ </div>
	水 100ℓ当り ナリアWDG 50g（前日、3回） コルト顆粒水和剤 10g（前日、3回）
散布量	500ℓ/10a
注意事項	ナリアWDGは、ぶどう（ピオーネ）、洋なし（ル・レクチェ）等に薬害が生じるので、飛散しないようにする。

次面も必ずご覧ください

●着色管理

(1) 摘芯・誘引を実施して、下垂している結果枝は支柱や枝つりをする

(2) 葉摘み

- ・収穫予定の7～10日前頃から行い、果実直接覆いかぶさる葉を摘み取る

- ・摘み取る葉数は、果そう葉の3分の1程度を限度に、できるだけ少なめにとどめる。

⇒肥大に影響

(3) 葉上げ（雨よけハウスで実施）

- 葉摘みには限界があるので、輪ゴム・テープナー等で葉を束ねる

(4) 反射マルチ

- ・着色始め頃から設置する

- ・高温対策として、白色マルチは「タイベック」「パールライトWS」等を使用する

- ・着色を得られた部分は、マルチを早めに除去する

●その他

- ・雨よけハウスの被覆 ⇒ 5月17日～22日頃

高温による着色不良やウルミ果の発生を防ぐため、晴天時は天窓・サイドビニールを開ける

次回特報発行予定日：6月3日

問合先：園芸課・担当 横田（080-5147-8257）