

水 稲 特 報

令和7年 5月16日
J A中野市営農センター

1. 水田の雑草発生にあわせた防除方法（初期～中期）

散布 時期 雑草 条件	(/) 田植え当日	(/) 7日後	(/) 15日後	30日後
水持ちの 良い水田	《707Pル体系》 初期除草剤	エリジャン乳剤（300ml） 移植直後～ル I 1 葉期まで	初・中 期 一発除草剤	シンズイZフロアブル（500ml） 移植3日後～ル I 4.0 葉期まで、 但し移植後30日まで
	【省力型体系】 初期除草剤	アップレZジャンボ（400g） 移植3日後～ル I 3 葉期まで （但し、移植後30日まで）	中 後 期 除 草 剤	ツイゲキ豆つぶ 250（250g） 移植後14日（休5葉期）～ ル I 4.0 葉期まで 但し収穫60日前まで
			中 後 期 除 草 剤	ソニックブームSジャンボ （500g） 移植後14日～ル I 4.0 葉期まで 但し収穫60日前まで
水持ちの 悪い水田	《粒剤体系》 初期除草剤	アップレZ 1キロ粒剤 （1kg） 移植直後～ル I 3.0 葉期まで （但し、移植後30日まで）	中 後 期 除 草 剤	レプラス1キロ粒剤（1kg） 移植後14日～ル I 4.0 葉期まで 但し収穫60日前まで
雑草の 少ない 水田	<一発処理> 初・中 期 一発除草剤	アップレZ 1キロ粒剤（1kg） 移植直後～ル I 3.0 葉期まで シンズイZ707Pル（500ml） 移植後3日～ル I 4.0 葉期まで アップレZジャンボ（400g） 移植後3日～ル I 3.5 葉期まで		

雑草対策のポイント

① 田をなるべく平らに ～高低差が大きいと苗が水没したり地面が見えたりするため水管理も大変～

【注意点】

- 代かきから、1回目の除草剤散布まで10日以上空くと雑草が除草剤の有効葉枚数を超過するリスクが高くなります。
有効葉枚数を考え適期に使用しましょう。（裏面参照）
- 代かき～田植えまで7日以上間隔があくと雑草の発生リスクが高くなります。
※代かき～田植えまで7日以上空く場合は、初期除草剤（先陣ジャンボ等）を代かき後、
水が濁っているうちに散布する。

② 水持ちに応じた除草剤のタイプを選択

水持ちが悪い田（1日で水が3cm減る田）は粒剤がオススメ。
ジャンボ剤は水深5cm以上で散布すると拡散しやすくなります。（イネが水没しないよう注意）

③ 除草剤散布後に水を動かさない期間をつくる

除草剤の処理層が安定するまでに48～72時間ほどかかるといわれています。
成分が安定する前に水を動かすと、処理層が上手く形成されず期待した効果がえられないことも。
水持ちが悪い田は苗が水没しない程度に深水にしてから散布後1日は水を止めましょう。
入水する場合も勢いよく入れると処理層が剥がれる原因になるので気をつけましょう。

2. 病虫害防除方法

※育苗箱施薬の場合（※播種時に混和处理してある場合は、移植当日の散布不要）

農 薬 名 (総使用回数)	施薬量 1 箱当り	対 象 病 害 虫									注 意 事 項
		イミズ ザウシ	イト ロイシ	ニカメイト ウ		イト ムシ	イト ナメ	ツグ ロコバ	フタオビ コヤガ	葉いも ち病	
				第 1 世代	第 2 世代						
ブーンパディート箱粒剤 (1回)	50 g	○	○	○	○	○	○	○	○	○	軟弱徒長苗、ムシ苗には使用はさける。苗箱の上から均一に散布し、茎葉に付着した薬剤を払落して使用する。散布後長く放置すると薬害が出るので出来るだけ早く植付ける。ブーンパディート箱粒剤、パディート箱粒剤はニカメイトウの第2世代までの防除を省略することができ、イトムシ、ツグロコバ(アムシ)」にも有効。また、ブーンパディート箱粒剤は葉いもち病に対しても同時防除ができる。
パディート箱粒剤 (1 回)	50 g	○	○	○	○	○	○	○	○		

除草剤使用時期及び有効草種・葉枚数一覧表

区分	除草剤名	使用適期	ノビエ	ホタルイ	ミスガヤツリ	ウリカワ	オモダカ	クログワイ	ヒルムシロ	藻類・（表層剥離）
初期	先陣ジャンボ	植代後～移植前 7 日	1.0	0.5	0.5	0.5	0	-	-	0.5
		移植直後～ル I 1.0 葉期								
	エリジャン乳剤	植代後～移植前 7 日	1.0	0.5						
		移植直後～ル I 1.0 葉期								
初中期	アップレ Z 1 キロ粒剤	移植直後～ル I 3.0 葉期 ただし移植後 30 日まで	3.0	4.0	4.0	3.0	0.5	0.5	発生期	0
	シンズイ Z フロアブル	移植後 3 日～ル I 4.0 葉期 ただし移植後 30 日まで	4.0	4.0	10 cm	3.0	矢尻葉 1.0	10 cm	発生盛期	0
	アップレ Z ジャンボ	移植後 3 日～ル I 3.0 葉期 但し移植後 30 日まで	3.0	4.0	3.0	3.0	0.5	0.5	発生期	0
中後期	ソニックブーム S ジャンボ	移植後 14 日～ル I 4.0 葉期まで （収穫 60 日前まで）	4.0	花茎 15 cm	草丈 25 cm	5.0	矢尻葉 4.0	草丈 20 cm	発生盛期	0.5
	ツイゲキ豆つぶ 250	移植後 14 日（ル 5 葉期以降） ～ル I 4.0 葉期まで ただし、収穫 60 日前まで	4.0	草丈 20 cm	5.0	5.0	矢尻葉 4.0	草丈 30 cm	発生盛期	0.5
	レプラス 1 キロ粒剤	移植後 14 日～ル I 4.0 葉期まで ただし、収穫 60 日前まで	4.0	花茎 10 cm	4.0	4.0	矢尻葉 3.0	草丈 30 cm	生育期	-
後期	バサグラン粒剤	移植後 15～55 日 クログワイ対象 移植後 15～35 日	-	増殖中期			発生前期	草丈 15 cm	-	-
	クリンチャーバス ME 液剤	移植後 15 日～ル I 5 葉期 （収穫 50 日前まで）	5.0	増殖中期			草丈 15 cm	草丈 20 cm	-	-
藻類	モゲトン粒剤	発生始～収穫 45 日前 （ウリカワ、ヒルムシロは 3～4kg）	-	-	-	4.0	-	-	増殖期	発生盛期

※表の数字は有効葉枚数となっております。0 は発生前、0.5 は発生始期を表しております。