

水稻特報

★ 昨 年 並 み の 生 育 ・ 刈 り 遅 れ に 注 意

本年も幼穂形成期から高温が続いており、昨年並みの登熟期になると見込まれます。
昨年は高温や刈り遅れによる胴割れ米が目立ちました。適期収穫できるよう刈取り計画をすすめてください。

1. 落水時期の目安：刈取り予定の 10 日～20 日前から落水

今年も高温傾向のため、早期落水による胴割れリスクが高いです。落水時期に気を付けてください。

2. 成熟期の判断方法

①稲穂の成熟（詳しくは裏面の「帯緑色籾歩合による収穫適期判断法」をご覧ください。）

（1）穂の大部分の籾が黄化し、穂首に近い部分の籾に 10～5%程度青みが残る頃（穂から青みが完全に抜けたら胴割米発生）

（2）籾の黄化程度が90%の頃（バインダー刈りの場合）

※稲穂で判断する場合、外周より少し内側に入ったところの株の状況を確認しましょう。

②出穂期後の日数から見た成熟期

早生種：40～45日（あきたこまち）、 中生種：45～50日（コシヒカリ、風さやか、もちひかり、モリモリモチ）

③登熟期積算温度から見た成熟期

中野市における登熟期積算温度（注1）は、概ね 1,030℃前後（コシヒカリ：南部 985℃、北部 1030℃、あきたこまち：950℃、風さやか： 概ね 1,120℃）です。仮に 9 月 1 日以降平年並みの気温で推移した試算が以下の登熟期と予想されます。

収穫適期は、登熟期の5日前～5日後の11日間となります。（注2）

例）コシヒカリ(南部)で8月6日出穂の場合、登熟期が9月13日で収穫適期は9月8日～9月18日となります

出穂期（注3）	登 熟 期			
	あきたこまち	コシヒカリ（南部）	コシヒカリ（北部）	風さやか
7 月 28 日	9 月 1 日			
7 月 31 日	9 月 5 日	9 月 6 日	9 月 8 日	
8 月 3 日	9 月 8 日	9 月 10 日	9 月 11 日	9 月 15 日
8 月 6 日	9 月 11 日	9 月 13 日	9 月 15 日	9 月 18 日
8 月 9 日	9 月 14 日	9 月 16 日	9 月 18 日	9 月 21 日
8 月 12 日	9 月 17 日	9 月 19 日	9 月 21 日	9 月 25 日
8 月 15 日		9 月 22 日	9 月 25 日	9 月 29 日
8 月 18 日		9 月 26 日	9 月 28 日	10 月 3 日

（注1）登熟期積算温度：出穂期の翌日から成熟期までの平均気温の積算値。

（注2）品種問わずに登熟期の5日後は胴割れが多めの傾向。風さやかは登熟期の5日前は青未熟粒が多めの傾向。

（注3）出 穂 期：全莖数の40～50%が出穂した日

◎はぜ掛け乾燥を行う皆さんへ

はぜ掛け期間の目安

- | | |
|-----------------------------|---|
| ●好天が続き、空気が乾燥している場合・・・4～ 5日間 | 乾燥状態を確かめる水分測定は南部・北部各ライスセンターで出来ますので、お問い合わせ下さい。 |
| ●降雨が少なく、晴天が多い場合・・・7～10日間 | |

＊乾燥⇒濡れ⇒乾燥を繰り返すと、胴割れ米の発生増加、食味の低下などにつながりますのでご注意下さい。

＊ハーベスターは使用前に必ず掃除を行って下さい。ネズミの巣となっている場合があります、糞など異物混入の恐れがあります。

裏 面 も ご 覧 く だ さ い ⇒

～ お米を出荷される皆様へ～

1. 令和7年度のライスセンター電話番号（※昨年とは番号が変わっております）

◎ 南部ライスセンター （0269）22-6019 （電話受付9/1～）

◎ 北部ライスセンター （0269）23-0740 （電話受付9/10～）

各ライスセンター稼働開始予定日 南部 9/6～、 北部 9/13～

◎ 「令和7年産水稻栽培日誌」及び「JA長野県安心基準米チェックシート」の提出について

『令和7年産水稻栽培日誌』は、産地並びに自分の栽培した農産物の安全性を保证する大切な資料となりますので、必ずご記入いただき出荷の際に提出をお願い致します。また、「JA長野県安心基準米チェックシート」は各ライスセンターに置いてありますので出荷される方は持ち帰り記入し、2枚複写のうち1枚目を粳摺り時にご提出ください。

1. 提出先 南部・北部 各ライスセンターまで
2. 提出日 ライスセンター出荷時
3. 対象者 **米を出荷する方**（自家用のみの方は提出の必要はありません。）

（重要）JAへお米を供出される方へのお願い

銘柄検査のための書類提出をお願いします。

- ・ 種苗の購入記録（購買伝票のコピー等）
- ・ 栽培日誌 など

書類の提出が無い場合、銘柄の判定を行えませんのでご注意ください。

※栽培日誌が届いていない、失くしてしまったなどありましたら園芸課まで連絡をお願いします。

※ご不明な点などありましたら、JA中野市園芸課までお問い合わせ下さい。（TEL 23-3933、FAX 23-2187）

◎ 帯緑色粳歩合による収穫適期判断法

1. 調査方法

- ① 平均的な生育をしている株を選び、その中で最も長い穂を2つ選ぶ
- ② 1つの穂にある全ての粳の数を数える。（不稔粳は除く）
- ③ わずかでも青味の残る粳の数を数える。（不稔粳は除く）
- ④ 全粳数のうち、青味の残る粳の割合（帯緑色粳歩合）を算出して下さい。

※穂全体の粳数が数えられない場合、目安として100粒と仮定して算出。

2. 判定方法

- ① 帯緑色粳歩合が20% …… 成熟期の約10日前（刈取り適期約5日前）
- ② // 10% …… 成熟期の約5日前（刈取り適期始期）
- ③ // 5% …… 成熟期 （刈取り最適期）
- ④ // 2% …… 成熟期後5日 （刈取り適期終期）
- ⑤ // 0% …… 成熟期後5日以上（刈り遅れ）⇒ 胴割米発生



左・中）まだ青い ⇒ 帯緑色粳
右）⇒ 完熟粳

帯緑色粳歩合（%）
＝ 帯緑色粳 / 穂についてる粳 × 100